

## Prospecto: información para el usuario

### Cetirizina MABO 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG cetirizina dihidrocloruro

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### Contenido del prospecto

1. Qué es Cetirizina MABO y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cetirizina MABO
3. Cómo tomar Cetirizina MABO
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Cetirizina MABO
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Cetirizina MABO y para qué se utiliza

El principio activo de este medicamento es la cetirizina dihidrocloruro.  
Este medicamento es un medicamento antialérgico.

Este medicamento está indicado en adultos y niños a partir de 6 años para:

- el alivio de los síntomas nasales y oculares de la rinitis alérgica estacional y perenne.
- el alivio de la urticaria

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cetirizina MABO

##### No tome Cetirizina MABO

- si tiene una enfermedad renal grave (insuficiencia renal grave con aclaramiento de creatinina por debajo de 10 ml/min);
- si es alérgico a cetirizina dihidrocloruro, a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6), a hidroxizina o a derivados de piperazina (principios activos estrechamente relacionados con otros fármacos).

##### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento:

- si es un paciente con insuficiencia renal, consulte a su médico; si es necesario, tomará una dosis más baja. Su médico determinará la nueva dosis.
- Si tiene problemas para orinar (como problemas de médula espinal o de próstata o vejiga) por favor, consulte a su médico.
- si es un paciente epiléptico o un paciente con riesgo de convulsiones, consulte a su médico.

No se han observado interacciones clínicamente significativas entre el alcohol (con un nivel en sangre de 0,5 por mil (g/l), correspondiente a un vaso de vino) y el uso de cetirizina a la dosis recomendada. Sin embargo, no hay disponibles datos de seguridad cuando se toman juntas dosis mayores de cetirizina y alcohol. Por tanto, como en el caso de todos los antihistamínicos, se recomienda evitar tomar cetirizina con alcohol.

Si tiene previsto que le realicen una prueba de alergia, consulte a su médico si debe interrumpir la toma de cetirizina unos días antes de la misma. Este medicamento puede afectar los resultados de sus pruebas de alergia.

### **Niños**

No administre este medicamento a niños menores de 6 años, ya que esta formulación no permite el ajuste necesario de la dosis..

### **Toma de Cetirizina MABO con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

### **Toma de Cetirizina MABO con los alimentos y bebidas**

La comida no afecta a la absorción de este medicamento.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Se debe evitar el uso de este medicamento en mujeres embarazadas. El uso accidental del medicamento en mujeres embarazadas no debe producir ningún efecto dañino sobre el feto. Sin embargo, el medicamento solo debe administrarse si es necesario y después de consultar con el médico.

La cetirizina pasa a la leche materna. No se puede excluir un riesgo de reacciones adversas en los lactantes. Por tanto, no debe tomar este medicamento durante la lactancia, a menos que consulte a su médico.

### **Conducción y uso de máquinas**

Los estudios clínicos no han mostrado evidencia de que este medicamento produzca alteraciones de la atención, disminución de la capacidad de reacción y la habilidad para conducir a la dosis recomendada. Si tiene intención de conducir, realizar actividades potencialmente peligrosas o utilizar maquinaria, no debe exceder de la dosis recomendada. Debe observar su respuesta al medicamento.

### **Cetirizina MABO contiene lactosa**

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### **Cetirizina MABO contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

### **3. Cómo tomar Cetirizina MABO**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Los comprimidos tienen que tragarse con un vaso de líquido.  
Los comprimidos se pueden dividir en dosis iguales.

#### **Adultos y adolescentes mayores de 12 años**

La dosis recomendada es 10 mg una vez al día como 1 comprimido.  
Otras formas de este medicamento pueden ser más adecuadas para los niños: pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **Uso en niños entre 6 y 12 años**

La dosis recomendada es 5 mg dos veces al día, como medio comprimido dos veces al día.  
Otras formas de este medicamento pueden ser más adecuadas para los niños: pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **Pacientes con insuficiencia renal**

Se recomienda a los pacientes con insuficiencia renal moderada tomar 5 mg una vez al día.

Si sufre de enfermedad renal grave, por favor contacte con su médico o farmacéutico, quienes pueden ajustar adecuadamente la dosis.

Si su hijo sufre enfermedad renal, por favor contacte con su médico o farmacéutico, quienes pueden ajustar la dosis de acuerdo a las necesidades de su hijo.

Si nota que el efecto de este medicamento es demasiado débil o fuerte, consulte a su médico.

#### **Duración del tratamiento**

La duración del tratamiento depende del tipo, duración y curso de sus molestias y se determinará por su médico.

#### **Si toma más Cetirizina MABO del que debe**

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, Tfno: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Después de una sobredosis, los efectos adversos descritos a continuación pueden ocurrir con una mayor intensidad. Se han comunicado efectos adversos como confusión, diarrea, mareo, fatiga, dolor de cabeza, debilidad, dilatación de la pupila, hormigueo, irritación, sedación, somnolencia, estupor, aumento anormal de la frecuencia cardiaca, temblor y retención urinaria.

#### **Si olvidó tomar Cetirizina MABO**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **Si interrumpe el tratamiento con Cetirizina MABO**

En raras ocasiones puede volver a aparecer prurito (picor intenso) y/o urticaria si deja de tomar este medicamento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Los siguientes efectos adversos son raros o muy raros, pero debe interrumpir la toma del medicamento y comentárselo inmediatamente a su médico si nota alguno de ellos:

- Reacciones alérgicas, incluyendo reacciones graves y angioedema (reacción alérgica grave que produce hinchazón de la cara o garganta).

Estas reacciones pueden comenzar pronto después de tomar por primera vez el medicamento, o pueden comenzar más tarde.

##### **Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes**

- **Fatiga**
- **Diarrea, sequedad de boca, náusea**
- **Mareo, dolor de cabeza**
- **Somnolencia (adormecimiento)**
- **Faringitis, rinitis** (en niños)

##### **Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes**

- **Dolor abdominal**
- **Astenia (fatiga extrema), malestar**
- **Parestesia (sensación anormal de la piel)**
- **Agitación**
- **Prurito, erupción**

##### **Raros: puede afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes**

- **Taquicardia (el corazón late demasiado rápido)**
- **Edema (hinchazón)**
- **Reacciones alérgicas, algunas graves (muy raro)**
- **Función hepática anormal**
- **Aumento de peso**
- **Convulsiones**
- **Agresividad, confusión, depresión, alucinación, insomnio**
- **Urticaria (habones)**

##### **Muy raros: puede afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes**

- **Trombocitopenia (niveles bajos de plaquetas en sangre)**
- **Trastornos de la acomodación (dificultad para fijar la vista), visión borrosa, giro ocular (los ojos tiene un movimiento circular incontrolado)**
- **Síncope**, discinesia (movimientos involuntarios), distonía (contracción muscular prolongada y anormal), **temblor, disgeusia (trastorno del gusto)**
- **Tic** (espasmos)
- **Angioedema (reacción alérgica grave que produce hinchazón de la cara o garganta), erupción debida al fármaco**

- **Dificultad o falta de control al orinar (mojar la cama, dolor y/o dificultad para orinar)**

**Efectos adversos con frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)**

- **Aumento del apetito**
- **Pensamientos suicidas (pensamientos recurrentes u obsesión por el suicidio), pesadillas**
- **Amnesia, deterioro de la memoria**
- **Vértigo (sensación de giro o movimiento)**
- **Retención urinaria (incapacidad para vaciar completamente la vejiga urinaria)**
- **Prurito (picor intenso) y/o urticaria tras la suspensión del tratamiento**
- **Dolor en las articulaciones**
- **Erupción con ampollas que tienen pus**
- **Hepatitis (inflamación del hígado)**

### **Comunicación de efectos adversos**


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Cetirizina MABO**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y el blíster después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No se requieren condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Cetirizina MABO**

- El principio activo es cetirizina dihidrocloruro. Cada comprimido recubierto contiene 10 mg de cetirizina dihidrocloruro.
- Los demás componentes son:
  - Núcleo: celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, estearato magnésico, sílice coloidal anhidra, croscarmelosa sódica.
  - Recubrimiento (Opadry blanco Y-1-7000): hipromelosa , macrogol 400, dióxido de titanio (E171).

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Comprimidos recubiertos con película, blancos, biconvexos, ranurados en una cara y lisos en la otra. El comprimido se puede dividir en dosis iguales.

Envase con 20 comprimidos.

**Titular de la autorización de comercialización**

MABO-FARMA, S.A.  
Calle Vía de los Poblados, 3, Edificio 6  
28033 Madrid,  
España.

**Responsable de la fabricación**

NETPHARMALAB CONSULTING SERVICES  
Carretera de Fuencarral, 22  
28108 – Alcobendas, Madrid (España)

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Noviembre 2021**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>