

## **Prospecto: información para el paciente**

### **Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica 10 mg cápsulas duras EFG**

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica
3. Cómo tomar Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica y para qué se utiliza**

Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica contiene el principio activo rivaroxabán y se usa en adultos para:

- prevenir la formación de coágulos de sangre en las venas después de una operación de sustitución de cadera o rodilla. Su médico le ha recetado este medicamento porque después de una operación tiene más riesgo de que se le formen coágulos de sangre.
- tratar los coágulos de sangre en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda) y en los vasos sanguíneos de los pulmones (embolia pulmonar), y para prevenir que estos coágulos de sangre vuelvan a aparecer en los vasos sanguíneos de las piernas y/o de los pulmones.

Rivaroxabán pertenece a un grupo de medicamentos llamados medicamentos antitrombóticos. Actúa bloqueando un factor de la coagulación (factor Xa) y por lo tanto, reduciendo la tendencia de la sangre a formar coágulos.

#### **2. Qué necesita saber antes de tomar Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

##### **No tome Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

- si es alérgico a rivaroxabán o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6),
- si sangra excesivamente,
- si padece una enfermedad o problemas en un órgano del cuerpo que aumente el riesgo de hemorragia grave (p. ej., úlcera de estómago, lesión o hemorragia en el cerebro, o una intervención quirúrgica reciente en el cerebro o en los ojos),
- si está tomando medicamentos para prevenir la formación de coágulos sanguíneos (p. ej., warfarina, dabigatrán, apixabán o heparina), excepto cuando esté cambiando de tratamiento anticoagulante o mientras se le esté administrando heparina a través de un catéter venoso o arterial, para que éste no se obstruya,
- si padece una enfermedad del hígado que pueda aumentar el riesgo de sangrado,

- si está embarazada o en período de lactancia.

**No tome rivaroxabán e informe a su médico** si alguna de estas circunstancias se aplica a su caso.

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o, farmacéutico antes de empezar a tomar rivaroxabán.

### **Tenga especial cuidado con Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

- si presenta un riesgo aumentado de sangrado, como puede suceder en las siguientes situaciones:
  - insuficiencia renal moderada o grave, ya que el funcionamiento de los riñones puede afectar a la cantidad de medicamento que actúa en su organismo,
  - si está tomando otros medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre (p. ej., warfarina, dabigatrán, apixabán o heparina), cuando cambie a otro tratamiento anticoagulante o mientras reciba heparina a través de un catéter venoso o arterial, para que éste no se obstruya (ver sección “Otros medicamentos y Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica”),
  - enfermedad hemorrágica,
  - presión arterial muy alta, no controlada por tratamiento médico,
  - enfermedades del estómago o del intestino que puedan causar una hemorragia, como p. ej., inflamación del estómago o del intestino, inflamación del esófago (garganta), p. ej., debido a la enfermedad de reflujo gastroesofágico (enfermedad en la que el ácido del estómago asciende hacia arriba en el esófago) o tumores localizados en el estómago, los intestinos o el tracto genital o el tracto urinario,
  - un problema en los vasos sanguíneos de la parte posterior de sus ojos (retinopatía),
  - una enfermedad pulmonar en la que los bronquios están dilatados y llenos de pus (bronquiectasia) o bien, ha sufrido una hemorragia previa en los pulmones,
- si lleva una prótesis valvular cardíaca,
- si sabe que padece una enfermedad denominada síndrome antifosfolípido (un trastorno del sistema inmunitario que aumenta el riesgo de que se formen coágulos de sangre), informe a su médico para que decida si puede ser necesario modificar el tratamiento,
- si su médico determina que su presión arterial es inestable o tiene previsto recibir otro tratamiento o ser sometido a un procedimiento quirúrgico para extraer un coágulo de sangre de sus pulmones.

**Informe a su médico si presenta alguna de estas situaciones** antes de tomar rivaroxabán. Su médico decidirá si debe ser tratado con este medicamento y si debe mantenerse bajo observación más estrecha.

### **Si necesita una intervención quirúrgica**

- Es muy importante tomar rivaroxabán antes y después de la operación, exactamente a las horas en que su médico se lo indique.
- Si su operación requiere la colocación de un catéter o inyección en la columna vertebral (p.ej., para anestesia epidural o espinal, o reducción del dolor):
  - es muy importante tomar rivaroxabán, exactamente a las horas que su médico le haya indicado,
  - informe a su médico inmediatamente si presenta adormecimiento o debilidad en las piernas o problemas en el intestino o en la vejiga al final de la anestesia, porque es necesaria una atención urgente.

### **Niños y adolescentes**

Rivaroxabán 10 mg cápsulas **no está recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años**. No se dispone de suficiente información sobre su uso en niños y adolescentes.

### **Otros medicamentos y Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

- Si está tomando

- algún medicamento para una infección por hongos (p. ej., fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol), salvo si sólo se aplican en la piel,
- comprimidos con ketoconazol (se usan para tratar el síndrome de Cushing, en el que el cuerpo produce un exceso de cortisol),
- algún medicamento para infecciones bacterianas (p. ej., claritromicina, eritromicina)
- algún medicamento antiviral para el VIH / SIDA (p. ej., ritonavir),
- otros medicamentos para disminuir la coagulación de la sangre (p. ej., enoxaparina, clopidogrel o antagonistas de la vitamina K, como la warfarina o el acenocumarol),
- antiinflamatorios y medicamentos para aliviar el dolor (p. ej., naproxeno o ácido acetilsalicílico),
- dronedarona, un medicamento para el tratamiento del latido cardíaco irregular,
- algunos medicamentos para tratar la depresión (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN)).

**Si alguna de las circunstancias anteriores le aplica, informe a su médico** antes de tomar rivaroxabán, porque el efecto de este medicamento podría verse aumentado. Su médico decidirá si debe ser tratado con este medicamento y si debe mantenerse bajo observación más estrecha.

Si su médico considera que tiene un mayor riesgo de desarrollar una úlcera gástrica o intestinal, podría recomendarle utilizar además, un tratamiento preventivo.

- Si está tomando
  - algún medicamento para el tratamiento de la epilepsia (fenitoína, carbamazepina, fenobarbital),
  - hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) una planta medicinal para el tratamiento de la depresión,
  - rifampicina, un antibiótico.

**Si alguna de las circunstancias anteriores le aplican, informe a su médico** antes de tomar rivaroxabán, porque el efecto de este medicamento podría verse reducido. Su médico decidirá si debe ser tratado con rivaroxabán y si debe mantenerse bajo observación más estrecha.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, no tome rivaroxabán. Si hay alguna posibilidad de que se quede embarazada, utilice un anticonceptivo fiable mientras toma este medicamento. Si se queda embarazada mientras toma rivaroxabán, informe inmediatamente a su médico, quien decidirá cómo deberá tratarse.

### **Conducción y uso de máquinas**

Rivaroxabán puede causar mareos (efecto adverso frecuente) o desvanecimientos (efecto adverso poco frecuente) (ver sección 4, “Posibles efectos adversos”). No debe conducir, montar en bicicleta o utilizar herramientas o máquinas si está afectado por estos síntomas.

### **Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica contiene lactosa y sodio**

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por cápsula; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

## **3. Cómo tomar Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

### **Qué dosis tomar**

- Para prevenir la formación de coágulos de sangre en las venas después de una operación de sustitución de cadera o rodilla.  
La dosis recomendada es una cápsula de rivaroxabán de 10 mg una vez al día.
- Para tratar los coágulos de sangre en las venas de las piernas y en los vasos sanguíneos de los pulmones, y para prevenir que los coágulos de sangre se vuelvan a producir.  
Después de por lo menos 6 meses de tratamiento de los coágulos de sangre, la dosis recomendada es una cápsula de 10 mg una vez al día o una cápsula de 20 mg una vez al día. Su médico le ha recetado rivaroxabán 10 mg una vez al día.

Trague la cápsula, preferiblemente con agua.  
Rivaroxabán puede tomarse con o sin alimentos.

Si tiene dificultad para tragar la cápsula entera, consulte a su médico sobre otras formas de tomar rivaroxabán. El contenido de la cápsula puede mezclarse con agua o con puré de manzana, inmediatamente antes de tomarlo.

Si es necesario, su médico también puede administrarle el contenido de la cápsula a través de una sonda gástrica.

### **Cuándo tomar Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

Tome la cápsula cada día, hasta que su médico se lo indique.  
Trate de tomar la cápsula a la misma hora cada día, para ayudarlo a recordarlo.  
El médico decidirá durante cuánto tiempo debe seguir tomando el tratamiento.

Para prevenir la formación de coágulos de sangre en las venas después de una operación de sustitución de cadera o rodilla:

Tome la primera cápsula 6 a 10 horas después de la operación.

Si se ha sometido a una cirugía mayor de cadera, generalmente tomará cápsulas durante 5 semanas.

Si se ha sometido a una cirugía mayor de rodilla, generalmente tomará cápsulas durante 2 semanas.

### **Si toma más Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica del que debe**

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Llame inmediatamente a su médico si ha tomado demasiadas cápsulas de rivaroxabán. Tomar demasiado rivaroxabán aumenta el riesgo de sangrado.

### **Si olvidó tomar Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

Si olvidó tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. Tome la siguiente cápsula al día siguiente y, después, siga tomando una cápsula cada día, como de costumbre.  
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### **Si interrumpe el tratamiento con Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica**

No interrumpa el tratamiento con rivaroxabán sin hablar antes con su médico, porque rivaroxabán previene el desarrollo de una afección grave.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Al igual que otros medicamentos similares para reducir la formación de coágulos sanguíneos, este medicamento puede causar sangrados que pueden poner en peligro la vida del paciente. Un sangrado excesivo puede causar una caída repentina de la presión arterial (shock). En algunos casos el sangrado puede no ser evidente.

**Avise inmediatamente a su médico si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos:**

- **Signos de sangrado**
  - sangrado en el cerebro o en el interior del cráneo (los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, debilidad en un lado del cuerpo, vómitos, convulsiones, disminución del nivel de conciencia y rigidez en el cuello. Se trata de una emergencia médica grave. ¡Acuda inmediatamente al médico!
  - Sangrado prolongado o excesivo,
  - debilidad excepcional, cansancio, palidez, mareos, dolor de cabeza, hinchazón inexplicable, dificultad para respirar, dolor en el pecho o angina de pecho,Su médico decidirá entre mantenerle bajo una observación más estrecha o cambiarle el tratamiento.
- **Signos de reacciones graves en la piel**
  - erupciones cutáneas intensas que se extienden, ampollas o lesiones en las mucosas, p.ej., en la boca o en los ojos (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica),
  - reacción a medicamentos que causa erupción, fiebre, inflamación de los órganos internos, anormalidades en la sangre y enfermedad sistémica (síndrome DRESS). La frecuencia de estos efectos adversos es muy rara (hasta 1 de cada 10.000 personas).
- **Signos de reacciones alérgicas graves**
  - hinchazón de la cara, labios, boca, lengua o garganta; dificultad para tragar; urticaria y dificultad para respirar; bajada repentina de la presión arterial.Las frecuencias de estas reacciones adversas graves son muy raras (reacciones anafilácticas, que incluyen shock anafiláctico; pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas) y poco frecuentes (angioedema y edema alérgico; pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas).

#### Lista general de posibles efectos adversos

**Frecuentes** (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas)

- disminución de los glóbulos rojos que puede causar palidez y debilidad o dificultad para respirar,
- sangrado del estómago o del intestino, hemorragia urogenital (incluyendo sangre en la orina y sangrado menstrual abundante), hemorragia nasal, sangrado de las encías,
- sangrado en el ojo (incluyendo sangrado en la parte blanca del ojo),
- sangrado hacia un tejido o cavidad del organismo (hematoma, cardenales),
- tos con sangre,
- sangrado de la piel o debajo de la piel,
- sangrado después de una operación,
- supuración de sangre o líquido de una herida quirúrgica,
- hinchazón de las extremidades,
- dolor de las extremidades,
- alteración de la función de los riñones (puede verse en los análisis realizados por el médico),

- fiebre,
- dolor de estómago, indigestión, mareo o sensación de mareo, estreñimiento, diarrea,
- presión arterial baja (los síntomas pueden ser sensación de mareo o desvanecimiento al ponerse de pie),
- disminución general de la fuerza y la energía (debilidad, cansancio), dolor de cabeza, mareos,
- sarpullido, picor de la piel,
- los análisis de sangre pueden mostrar un aumento de algunas enzimas del hígado.

**Poco frecuentes** (pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas)

- sangrado en el cerebro o en el interior del cráneo (ver arriba, signos de sangrado),
- sangrado en una articulación, que causa dolor e hinchazón,
- trombocitopenia (número bajo de plaquetas, células que ayudan a la coagulación de la sangre),
- reacción alérgica, incluyendo reacción alérgica de la piel,
- alteración de la función del hígado (puede verse en los análisis realizados por el médico),
- los análisis de sangre pueden mostrar un aumento de la bilirrubina, de algunas enzimas pancreáticas o hepáticas, o del número de plaquetas,
- desvanecimiento,
- sensación de malestar,
- aumento de la frecuencia cardíaca,
- sequedad de boca,
- ronchas.

**Raros** (pueden afectar a hasta 1 de cada 1.000 personas)

- sangrado en un músculo,
- colestasis (disminución del flujo de bilis), hepatitis que incluye lesión traumática hepatocelular (inflamación o daño hepático),
- coloración amarillenta de la piel y en los ojos (ictericia),
- hinchazón localizada,
- acumulación de sangre (hematoma) en la ingle como complicación después de una cirugía cardíaca en la que se introduce un catéter en la arteria de la pierna (pseudoaneurisma).

**Muy raros** (pueden afectar a hasta 1 de cada 10.000 personas)

- acumulación de eosinófilos, un tipo de glóbulos blancos granulocíticos que causan inflamación en el pulmón (neumonía eosinofílica).

**Frecuencia no conocida** (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- insuficiencia renal después de una hemorragia grave.
- sangrado en el riñón, a veces con presencia de sangre en la orina, lo que provoca la incapacidad de los riñones para funcionar correctamente (nefropatía relacionada con anticoagulantes),
- aumento de la presión en los músculos de las piernas o de los brazos después de una hemorragia, que causa dolor, hinchazón, alteración de la sensibilidad, adormecimiento o parálisis (síndrome compartimental después de una hemorragia).

**Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o, farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Conservación de Rivaroxaban Sandoz Farmacéutica

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, y en cada blíster o frasco después de CAD/EXP. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

### *Cápsulas abiertas*

El contenido de la cápsula es estable en agua o puré de manzana durante hasta 4 horas.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica

- El principio activo es rivaroxabán. Cada cápsula contiene 10 mg de rivaroxabán.
- Los demás componentes son:  
Contenido de la cápsula: celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, citrato cálcico, povidona, croscarmelosa sódica, laurilsulfato de sodio, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio. Ver sección 2 “Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica contiene lactosa y sodio”.  
Cuerpo de la cápsula: óxido de hierro rojo (E172), dióxido de titanio (E 171), carragenano, cloruro potásico, agua, hipromelosa.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Las cápsulas de Rivaroxabán Sandoz Farmacéutica 10 mg son cápsulas duras de tamaño No. 4 (14 mm de largo x 5 mm de ancho) rojas opacas que contienen polvo blanco.

Las cápsulas están disponibles en blíster PVC/PVDC-Alu

*Tamaños de envases:* 10, 30 y 98 cápsulas.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

#### Titular de la autorización de comercialización

Sandoz Farmacéutica, S.A.  
Centro Empresarial Parque Norte  
Edificio Roble  
C/ Serrano Galvache, 56  
28033 Madrid  
España

#### Responsable de la fabricación

Salutas Pharma GmbH  
Otto von Guericke Allee 1  
39179 Barleben  
Alemania

6

Pharmadox Healthcare Limited  
KW20A Kordin Industrial Park,  
Paola PLA 3000  
Malta

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** febrero 2025

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>