

## Prospecto: información para el usuario

### Ticagrelor Aurovitas 60 mg comprimidos recubiertos con película EFG Ticagrelor Aurovitas 90 mg comprimidos recubiertos con película EFG

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Ticagrelor Aurovitas y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Ticagrelor Aurovitas
3. Cómo tomar Ticagrelor Aurovitas
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Ticagrelor Aurovitas
6. Contenido del envase e información adicional

### 1. Qué es Ticagrelor Aurovitas y para qué se utiliza

#### Qué es Ticagrelor Aurovitas

Ticagrelor Aurovitas contiene un principio activo denominado ticagrelor. Pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiagregantes plaquetarios.

#### Para qué se utiliza Ticagrelor Aurovitas

Ticagrelor en combinación con ácido acetilsalicílico (otro antiagregante plaquetario) se debe utilizar solamente en adultos. Se le ha recetado este medicamento porque ha tenido:

##### Para 60 mg:

- un infarto de miocardio, hace más de un año.

##### Para 90 mg:

- un infarto, o
- una angina inestable (angina de pecho o dolor torácico no controlado adecuadamente).

Este medicamento disminuye el riesgo de sufrir otro infarto de miocardio, un infarto cerebral o de morir por una enfermedad relacionada con el corazón o los vasos sanguíneos.

#### Cómo actúa Ticagrelor Aurovitas

Ticagrelor actúa sobre las células llamadas "plaquetas" (también llamadas trombocitos). Estas células muy pequeñas de la sangre ayudan a detener hemorragias agrupándose para taponar pequeños agujeros en los vasos sanguíneos que estén cortados o dañados.

Sin embargo, las plaquetas también pueden formar coágulos dentro de vasos sanguíneos dañados en el corazón y cerebro. Eso puede ser muy peligroso porque:

- el coágulo puede interrumpir totalmente el riego sanguíneo; esto puede provocar un ataque al corazón (infarto de miocardio) o un infarto cerebral, o
- el coágulo puede bloquear parcialmente los vasos sanguíneos que van al corazón; esto disminuye el flujo de sangre al corazón y puede producir un dolor torácico intermitente (denominada “angina inestable”).

Ticagrelor ayuda a impedir la agregación de las plaquetas. Esto reduce la posibilidad de que se forme un coágulo de sangre que pueda reducir el flujo de sangre.

## **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Ticagrelor Aurovitas**

### **No tome Ticagrelor Aurovitas**

- Si es alérgico a ticagrelor o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Tiene una hemorragia actualmente.
- Ha tenido un infarto cerebral provocado por una hemorragia cerebral.
- Tiene enfermedad hepática grave.
- Está tomando alguno de los siguientes medicamentos:
  - ketoconazol (usado para tratar infecciones fúngicas).
  - claritromicina (usado para tratar infecciones bacterianas).
  - nefazodona (un antidepresivo).
  - ritonavir y atazanavir (usados para tratar la infección por VIH y el SIDA).

No tome ticagrelor si se encuentra en alguna de las circunstancias anteriores. Si tiene dudas, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar ticagrelor si:

- Tiene un mayor riesgo de hemorragia debido a:
  - una lesión grave reciente.
  - una intervención quirúrgica reciente (incluidas las dentales, pregunte a su dentista sobre esto).
  - tiene un trastorno que afecta a la coagulación de la sangre.
  - una hemorragia reciente de estómago o del intestino (como úlcera de estómago o “pólipos” de colon).
- Debe someterse a una intervención quirúrgica (incluidas las dentales) en cualquier momento mientras esté tomando ticagrelor. Esto se debe a que aumenta el riesgo de hemorragia. Posiblemente su médico quiera suspender el tratamiento con este medicamento 5 días antes de la cirugía.
- Su ritmo cardíaco es anormalmente lento (normalmente menos de 60 latidos por minuto) y no tiene ya implantado un dispositivo que regule su corazón (marcapasos).
- Tiene asma u otros problemas pulmonares o dificultades para respirar.
- Desarrolla patrones de respiración irregular, como aceleración, enlentecimiento o breves pausas en la respiración. Su médico decidirá si necesita alguna evaluación adicional.
- Ha tenido algún problema en su hígado o ha tenido anteriormente alguna enfermedad que le puede haber afectado al hígado.
- Ha tenido un análisis sanguíneo que muestra que la cantidad de ácido úrico es mayor a la normal.

Si cualquiera de lo anterior se aplica a su caso (o si no está seguro), consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Si está tomando ticagrelor y heparina:

- Su médico puede requerir una muestra de su sangre para pruebas diagnósticas si sospecha de la presencia de un trastorno raro de las plaquetas causado por la heparina. Es importante que informe a su médico de que está tomando ticagrelor y heparina, ya que ticagrelor puede afectar a la prueba diagnóstica.

### Niños y adolescentes

No se recomienda administrar ticagrelor a niños y adolescentes menores de 18 años.

### Otros medicamentos y Ticagrelor Aurovitás

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Esto es debido a que ticagrelor puede afectar al mecanismo de acción de algunos medicamentos y algunos medicamentos pueden afectar a ticagrelor.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Rosuvastatina (un medicamento para tratar el colesterol alto).
- Más de 40 mg diarios de simvastatina o de lovastatina (medicamentos utilizados para tratar los niveles altos de colesterol).
- Rifampicina (un antibiótico).
- Fenitoína, carbamazepina y fenobarbital (usados para controlar los ataques epilépticos).
- Digoxina (usada para tratar la insuficiencia cardíaca).
- Ciclosporina (usada para disminuir las defensas del cuerpo).
- Quinidina y diltiazem (usados para tratar los ritmos cardíacos anormales).
- Betabloqueantes y verapamilo (usados para tratar la tensión arterial elevada).
- Morfina y otros opioides (usados para tratar el dolor grave).

En particular, informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos que aumentan el riesgo de hemorragia:

- “Anticoagulantes orales”, a menudo denominados “diluyentes de la sangre”, entre ellos warfarina.
- Medicamentos Antiinflamatorios No Esteroideos (abreviados como AINE), frecuentemente tomados como analgésicos, como ibuprofeno y naproxeno.
- Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (abreviados como ISRS), tomados como antidepresivos, como paroxetina, sertralina y citalopram.
- Otros medicamentos como ketoconazol (usado para tratar infecciones fúngicas), claritromicina (usado para tratar infecciones bacterianas), nefazodona (un antidepresivo), ritonavir y atazanavir (usados para tratar la infección por VIH y el SIDA), cisaprida (usado para tratar la acidez del estómago), alcaloides derivados del cornezuelo del centeno (usados para tratar migrañas y cefaleas).

Informe también a su médico que debido a que está tomando ticagrelor, podría presentar mayor riesgo de sangrado si su médico le administra fibrinolíticos, a menudo denominados “disolventes de coágulos”, como estreptoquinasa o alteplasa.

## **Embarazo y lactancia**

No se recomienda el uso de ticagrelor si está embarazada o puede quedarse embarazada. Las mujeres deberán utilizar métodos anticonceptivos apropiados para evitar el embarazo mientras tomen este medicamento.

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si está dando el pecho. Su médico le explicará los beneficios y los riesgos de tomar ticagrelor durante ese período.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

## **Conducción y uso de máquinas**

No es probable que ticagrelor afecte a su capacidad para conducir o usar máquinas. Si se siente mareado o confundido mientras toma este medicamento, tenga cuidado mientras conduce o utiliza máquinas.

## **Ticagrelor Aurovitas contiene lactosa**

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

## **Ticagrelor Aurovitas contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

## **3. Cómo tomar Ticagrelor Aurovitas**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

### **Cuánto debe tomar**

#### Para 60 mg:

- La dosis normal es de un comprimido de 60 mg dos veces al día. Continúe tomando ticagrelor mientras su médico se lo indique.
- Tome este medicamento a la misma hora todos los días (por ejemplo, un comprimido por la mañana y uno por la noche).

#### Para 90 mg:

- La dosis inicial es de dos comprimidos a la vez (dosis de carga de 180 mg). Esta dosis se le administrará normalmente en el hospital.
- Tras esta dosis inicial, la dosis normal es de un comprimido de 90 mg dos veces al día durante 12 meses, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Tome este medicamento a la misma hora todos los días (por ejemplo, un comprimido por la mañana y uno por la noche).

### **Toma de Ticagrelor Aurovitas con otros medicamentos para la coagulación sanguínea**

Su médico también le prescribirá normalmente ácido acetilsalicílico. Esta es una sustancia presente en muchos medicamentos utilizados para prevenir la coagulación de la sangre. Su médico le indicará cuánto debe tomar (normalmente entre 75-150 mg diarios).

### Cómo tomar Ticagrelor Aurovitás

- Puede tomar este medicamento con o sin alimentos.
- Puede comprobar cuándo tomó el último comprimido de ticagrelor mirando el blíster. Aparece un sol (para la mañana) y una luna (para la noche). Eso le indicará si ha tomado su dosis.

### Si tiene dificultad para tragar el comprimido

Si tiene dificultad para tragar el comprimido puede triturarlo y mezclar con agua de la siguiente manera:

- Triture el comprimido en un polvo fino.
- Vierta el polvo en medio vaso de agua.
- Remueva y beba inmediatamente.
- Para asegurarse de que no hay restos de medicamento, enjuague el vaso vacío con otro medio vaso de agua y bélalo.

Si usted se encuentra en el hospital, le pueden administrar este comprimido mezclado con un poco de agua y con un tubo a través de la nariz (sonda nasogástrica).

### Si toma más Ticagrelor Aurovitás del que debe

Si toma más ticagrelor del que debiera, consulte a su médico o acuda al hospital inmediatamente. Lleve consigo el envase del medicamento. Puede tener un riesgo mayor de hemorragia.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### Si olvidó tomar Ticagrelor Aurovitás

- Si se olvida de tomar una dosis, límítese a tomar su siguiente dosis a la hora habitual.
- No tome una dosis doble (dos dosis a la vez) para compensar las dosis olvidadas.

### Si interrumpe el tratamiento con Ticagrelor Aurovitás

No debe interrumpir este medicamento sin consultar a su médico. Tome este medicamento de forma regular y todo el tiempo que le indique su médico. Si deja de tomar este medicamento, puede aumentar el riesgo de sufrir otro infarto de miocardio o un infarto cerebral o de morir por una enfermedad relacionada con el corazón o los vasos sanguíneos.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Con este medicamento pueden aparecer los siguientes efectos adversos:

Ticagrelor afecta a la coagulación sanguínea, por lo que la mayoría de los efectos adversos están relacionados con hemorragias. Pueden aparecer hemorragias en cualquier parte del cuerpo. Cierto nivel de hemorragia es frecuente (como hematomas y sangrado por la nariz). Las hemorragias graves son poco frecuentes, pero pueden ser potencialmente mortales.

**Informe a su médico inmediatamente si observa algo de lo siguiente - podría necesitar tratamiento médico urgente:**

- **Una hemorragia en el cerebro o dentro del cráneo es un efecto adverso poco frecuente, y puede causar signos de un infarto cerebral como:**
  - entumecimiento o debilidad repentina de los brazos, las piernas o el rostro, sobre todo si afecta sólo a un lado del cuerpo.
  - confusión súbita, dificultad para hablar o para entender a los demás.
  - dificultad repentina para caminar o pérdida del equilibrio o de la coordinación.
  - sensación repentina de mareo o cefalea intensa repentina de causa desconocida.
- **Signos de hemorragias como:**
  - hemorragia grave o que no se puede controlar.
  - hemorragia inesperada o hemorragia que dura mucho tiempo.
  - orina de color rosa, roja o marrón.
  - vómitos con sangre roja o vómito que parece “granos de café”.
  - heces negras o rojas (parecen alquitrán).
  - tos o vómitos con sangre.
- **Desmayo (síncope)**
  - pérdida temporal de conciencia debida a una caída repentina del flujo sanguíneo al cerebro (frecuente).
- **Signos de un problema de coagulación sanguínea llamado Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT), tales como:**
  - Fiebre y manchas púrpuras (llamada púrpura) en la piel y en la boca, con o sin coloración amarillenta de la piel o de los ojos (ictericia), cansancio extremo inexplicable o confusión.

**Consulte a su médico si observa algo de lo siguiente:**

- **Sensación de dificultad para respirar - esto es muy frecuente.** Puede deberse a la enfermedad del corazón o a otra causa, o puede ser un efecto adverso de ticagrelor. La dificultad para respirar relacionada con ticagrelor es generalmente leve y se caracteriza por una necesidad repentina, inesperada de aire que se da normalmente en reposo y puede aparecer en las primeras semanas de tratamiento y en muchos casos puede desaparecer. Si cree que su dificultad para respirar ha empeorado o dura mucho tiempo, informe a su médico. Él decidirá si necesita un tratamiento o investigaciones complementarias.

**Otros posibles efectos adversos**

**Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)**

- Nivel alto de ácido úrico en sangre (como se observa en los análisis).
- Hemorragia causada por trastornos de la sangre.

**Frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas)**

- Hematomas.
- Dolor de cabeza.
- Sensación de mareo o como si todo girase.
- Diarrea o indigestión.
- Sensación de malestar (náuseas).
- Estreñimiento.
- Erupción.
- Picor.
- Dolor intenso e inflamación en las articulaciones – estos son signos degota.

- Sensación de mareo o aturdimiento, o visión borrosa – estos son signos de baja presión arterial.
- Hemorragia nasal.
- Sangrado más intenso de lo normal tras cirugía o cortes (por ejemplo, al afeitarse) y heridas.
- Sangrado de las paredes del estómago (úlcera).
- Sangrado de encías.

**Poco frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas)**

- Reacción alérgica – una erupción cutánea, picores o hinchazón de la cara o hinchazón de los labios/lengua pueden ser signos de una reacción alérgica.
- Confusión.
- Problemas en la visión provocados por sangre en el ojo.
- Sangrado vaginal más intenso, o que ocurre en momentos distintos, que su sangrado menstrual (periodo) habitual.
- Sangrado en las articulaciones y músculos que provoca una inflamación dolorosa.
- Sangre en el oído.
- Hemorragia interna, esto puede provocar mareo o aturdimiento.

**Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)**

- Frecuencia cardíaca anormalmente baja (normalmente por debajo de 60 latidos por minuto).

**Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

**5. Conservación de Ticagrelor Aurovit**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, el frasco o el blíster después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**6. Contenido del envase e información adicional****Composición de Ticagrelor Aurovit**

- El principio activo es ticagrelor.
  - Cada comprimido recubierto con película contiene 60 mg de ticagrelor.
  - Cada comprimido recubierto con película contiene 90 mg de ticagrelor.

- Los demás componentes son:

*Núcleo del comprimido:* lactosa monohidrato, celulosa microcristalina (grado 101 y 102), croscarmelosa sódica, hipromelosa 2910, sílice coloidal anhidra y estearato de magnesio.

*Recubrimiento del comprimido:* hipromelosa 2910, macrogol 4000, carbonato de calcio, óxido de hierro rojo (E172) (para la dosis de 60 mg), óxido de hierro amarillo (E172) (para la dosis de 90 mg).

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

#### *Ticagrelor Aurovitas 60 mg comprimidos recubiertos con película EFG*

Comprimidos recubiertos con película de color rosa claro a rosa, redondos, biconvexos, con las marcas “60” en una cara y “TL” en la otra.

#### *Ticagrelor Aurovitas 90 mg comprimidos recubiertos con película EFG*

Comprimidos recubiertos con película de color amarillo pálido a amarillo, redondos, biconvexos, con las marcas “90” en una cara y “TL” en la otra.

Ticagrelor Aurovitas está disponible en envases blíster y en frascos de HDPE.

#### **Tamaños de envase**

*Blíster:* 14, 30, 56, 60, 90, 100, 168, 180 y 200 comprimidos recubiertos con película.

*Blíster calendario:* 14, 56 y 168 comprimidos recubiertos con película.

*Frasco:* 250 y 500 comprimidos recubiertos con película.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

#### *Titular de la autorización de comercialización*

Aurovitas Spain, S.A.U.

Avda. de Burgos, 16-D

28036 Madrid

España

#### *Responsable de la fabricación*

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

O

Generis Farmacéutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugal

O

Arrow Génériques

26 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon  
Francia

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

Alemania:	Ticagrelor PUREN 60 mg Filmtabletten Ticagrelor PUREN 90 mg Filmtabletten
Bélgica:	Ticagrelor AB 60 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten Ticagrelor AB 90 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
España:	Ticagrelor Aurovitás 60 mg comprimidos recubiertos con película EFG Ticagrelor Aurovitás 90 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Francia:	TICAGRELOR ARROW 90 mg, comprimé pelliculé
Países Bajos:	Ticagrelor Aurobindo 60 mg, filmomhulde tabletten Ticagrelor Aurobindo 90 mg, filmomhulde tabletten
Polonia:	Ticagrelor Aurovitás
Portugal:	Ticagrelor Generis Phar

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Mayo 2025**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).