

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Decitabina Seacross 50 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG**

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Decitabina Seacross y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Decitabina Seacross
3. Cómo usar Decitabina Seacross
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Decitabina Seacross
6. Contenido del envase e información adicional

### **1. Qué es Decitabina Seacross y para qué se utiliza**

#### **Qué es Decitabina Seacross**

Decitabina Seacross es un medicamento contra el cáncer. Contiene el principio activo “decitabina”.

#### **Para qué se utiliza Decitabina Seacross**

Decitabina se utiliza para tratar un tipo de cáncer llamado “leucemia mieloide aguda” o “LMA”. Es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas. Se le administrará decitabina cuando se le diagnostique por primera vez LMA. Este medicamento se utiliza únicamente en adultos.

#### **Cómo actúa Decitabina Seacross**

Decitabina actúa impidiendo el crecimiento de las células cancerosas. También destruye las células del cáncer.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo actúa decitabina o por qué le han recetado este medicamento, consulte a su médico o enfermero.

### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Decitabina Seacross**

#### **No use Decitabina Seacross**

- si es alérgico a decitabina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si está dando el pecho.

Si no está seguro de si las condiciones anteriores le aplican a usted, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de utilizar Decitabina Seacross.

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Decitabina Seacross si tiene

- número bajo de plaquetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos,
- una infección,
- una enfermedad hepática,
- un trastorno renal grave,
- un trastorno cardíaco.

Si no está seguro de si las condiciones anteriores le aplican a usted, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de utilizar decitabina.

Decitabina puede provocar una reacción inmune grave llamada “síndrome de diferenciación” (ver sección 4 “Posibles efectos adversos”).

### **Pruebas o controles**

Se le harán análisis de sangre antes de empezar el tratamiento con decitabina y al comienzo de cada ciclo de tratamiento. Estas pruebas sirven para comprobar que:

- tiene suficientes células sanguíneas, y
- el hígado y los riñones funcionan correctamente.

Consulte a su médico el significado de los resultados de su análisis de sangre.

### **Niños y adolescentes**

Decitabina no debe utilizarse en niños ni adolescentes menores de 18 años.

### **Uso de Decitabina Seacross con otros medicamentos**

Informe a su médico, enfermero o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta y las plantas medicinales.

Decitabina puede afectar a la manera en que otros medicamentos actúan. Además, algunos otros medicamentos pueden afectar a la manera en que decitabina actúa.

### **Embarazo y lactancia**

- Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.
- No debe utilizar decitabina si está embarazada porque puede dañar a su hijo. Si usted puede quedarse embarazada, su médico le pedirá que se realice un test de embarazo antes de comenzar el tratamiento con decitabina. Informe a su médico de inmediato si se queda embarazada durante el tratamiento con decitabina.
- No puede dar el pecho a su hijo si está utilizando este medicamento, ya que se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna.

### **Fertilidad masculina y femenina y anticoncepción**

- Los hombres no deben engendrar un hijo mientras estén utilizando decitabina.
- Los hombres deben usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante 3 meses después de haber suspendido el tratamiento.
- Consulte a su médico si desea conservar su semen antes de comenzar el tratamiento.
- Las mujeres que pueden quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante los 6 meses siguientes a la finalización del tratamiento.
- Consulte con su médico si desea congelar sus óvulos antes de comenzar el tratamiento.

### **Conducción y uso de máquinas**

Es posible que se sienta cansado o débil después del uso de decitabina. Si es así, no conduzca ni utilice herramientas o máquinas.

### **Decitabina Seacross contiene potasio y sodio**

- Este medicamento contiene potasio, menos de 1 mmol (39 mg) por vial, es decir, es esencialmente "exento de potasio".
- Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (6,67 mg) por vial, es decir, es esencialmente "exento de sodio".

### **3. Cómo usar Decitabina Seacross**

Decitabina le será administrado por un médico o enfermero preparado para administrar este tipo de medicamento.

#### **Dosis recomendada**

- Su médico calculará su dosis de decitabina, que dependerá de su estatura y su peso (superficie corporal).
- La dosis es de 20 mg/m<sup>2</sup> de superficie corporal.
- Recibirá decitabina a diario durante 5 días, seguidos de 3 semanas sin fármaco. Esto se denomina un "ciclo de tratamiento" y se repetirá cada 4 semanas. Normalmente recibirá como mínimo.
- 4 ciclos de tratamiento.
- Su médico podrá retrasar la dosis y modificar el número total de ciclos, dependiendo de cómo responda al tratamiento.

#### **Cómo se administra Decitabina Seacross**

La solución se administra por vía intravenosa (como perfusión) durante una hora.

#### **Si está recibiendo más Decitabina Seacross del que debe**

Este medicamento será administrado por su médico o enfermero. Es muy poco probable que se le administre medicación en exceso (sobredosificación), en caso de que se le administrase, su médico le evaluará y en caso de encontrar efectos adversos manejarlos adecuadamente.

#### **Si ha olvidado su cita para la administración de Decitabina Seacross**

Si olvida una cita, solicite otra lo antes posible. Esto es debido a que es importante seguir la pauta de administración para que este medicamento sea lo más eficaz posible.

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte con su médico o enfermero.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Con este medicamento pueden aparecer los siguientes efectos adversos.

#### **Avise inmediatamente a su médico o enfermero si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos graves:**

- Fiebre: puede ser un signo de una infección causada por niveles bajos de glóbulos blancos (muy frecuente).
- Dolor en el pecho o dificultad para respirar (con o sin fiebre o tos): pueden ser signos de una infección de los pulmones denominada "neumonía" (muy frecuente) o pulmones inflamados (enfermedad

pulmonar intersticial [frecuencia no conocida]) o miocardiopatía (enfermedad del músculo cardíaco (corazón) [poco frecuente]) que se puede acompañar de hinchazón de tobillos, manos, piernas y pies.

- Hemorragia: incluyendo sangre en las heces. Puede ser un signo de hemorragia en el estómago o el intestino (frecuente).
- Dificultad para moverse, para hablar o entender o para ver; dolor de cabeza intenso y repentino, convulsiones, entumecimiento o debilidad en cualquier parte del cuerpo. Éstos pueden ser síntomas de hemorragia dentro de la cabeza (frecuente).
- Dificultad para respirar, hinchazón de los labios, picor o erupción cutánea. Se pueden deber a una reacción alérgica (hipersensibilidad) (frecuente).
- Reacción inmune grave (síndrome de diferenciación) que puede provocar fiebre, tos, dificultad para respirar, erupción cutánea, disminución de orina, hipotensión (presión arterial baja), hinchazón de los brazos o las piernas y aumento rápido de peso (no conocido).

Consulte inmediatamente a su médico o enfermero si experimenta alguno de los efectos adversos graves citados.

#### **Otros efectos adversos de decitabina son:**

##### **Muy frecuentes** (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes)

- infección de orina
- otra infección en cualquier parte del cuerpo, causada por bacterias, virus u hongos
- hemorragia o formación de hematomas con mayor facilidad - pueden ser signos de una disminución del número de plaquetas de la sangre (trombocitopenia)
- sensación de cansancio o palidez - pueden ser signos de una disminución del número de glóbulos rojos (anemia)
- nivel alto de azúcar en la sangre
- dolor de cabeza
- hemorragia nasal
- diarrea
- vómitos
- náuseas
- fiebre
- función hepática alterada

##### **Frecuentes** (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 pacientes)

- infección de la sangre provocada por bacterias - puede ser un signo de un nivel bajo de glóbulos blancos
- dolor de nariz o moqueo, dolor de los senos nasales
- llagas en la boca o la lengua
- aumento de los niveles de “bilirrubina” en la sangre

##### **Poco frecuentes** (pueden afectar hasta a 1 de cada 100 pacientes)

- disminución del número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas (pancitopenia)
- enfermedad del músculo cardíaco (corazón)
- placas rojas, elevadas y dolorosas en la piel, fiebre, aumento de los glóbulos blancos - pueden ser signos de “Dermatosis Neutrófila Febril Aguda” o “Síndrome de Sweet”

##### **No conocida** (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- intestino inflamado (enterocolitis, colitis y tiflitis), con síntomas de dolor abdominal, meteorismo (gases intestinales), o diarrea. La enterocolitis puede conducir a complicaciones por septicemia (respuesta del organismo ante una infección) y se puede asociar con desenlace mortal.

### Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Conservación de Decitabina Seacross

Su médico, enfermero o farmacéutico son los responsables de la conservación de decitabina.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la etiqueta del vial después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Tras la reconstitución, el concentrado se debe diluir posteriormente en el plazo de 15 minutos utilizando líquidos para perfusión refrigerados. Esta solución diluida preparada puede ser conservada refrigerada a 2 °C - 8 °C durante un máximo de 3 horas, seguidas de hasta 1 hora a temperatura ambiente (20 °C- 25 °C) antes de la administración.

Su médico, enfermero o farmacéutico es responsable de la correcta eliminación de decitabina no utilizado.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Decitabina Seacross

- El principio activo es decitabina. Cada vial de polvo contiene 50 mg de decitabina. Tras la reconstitución con 10 ml de agua para preparaciones inyectables, cada ml del concentrado contiene 5 mg de decitabina.
- Los demás componentes son dihidrogenofosfato de potasio (E 340), hidróxido de sodio (E 524), y ácido clorhídrico (para ajustar el pH). Ver sección 2.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Decitabina es un polvo para concentrado para solución para perfusión de color blanco o casi blanco. Se presenta en un vial de vidrio de 20 ml. Cada envase contiene 1 vial.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Seacross Pharma (Europe) Limited  
POD 13, The Old Station House  
15A Main Street, Blackrock  
Dublin, A94 T8P8  
Irlanda

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Países bajos | Decitabine Seacross 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie            |
| Alemania     | Decitabin Seacross 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| Portugal     | Decitabina Seacross                                                                      |

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| España | Decitabina Seacross 50 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG |
| Italia | Decitabina Seacross                                                               |

**Este prospecto ha sido aprobado en: Marzo 2026**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).

-----

Esta información está destinada únicamente a profesionales sanitarios:

## **1. RECONSTITUCIÓN**

Se debe evitar el contacto de la piel con la solución y se deben utilizar guantes protectores. Se deben adoptar los procedimientos habituales para el manejo de fármacos citotóxicos.

El polvo debe ser reconstituido en condiciones asépticas con 10 ml de agua para preparaciones inyectables. Tras la reconstitución, cada mililitro contiene aproximadamente 5 mg de decitabina a un pH de 6,7 a 7,3. En el plazo de 15 minutos desde la reconstitución, la solución se debe diluir posteriormente con líquidos para perfusión refrigerados (2 °C - 8 °C) (solución inyectable de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) o solución inyectable de glucosa al 5%) hasta lograr una concentración final de 0,15 a 1,0 mg/ml. Para el periodo de validez y las precauciones de conservación tras la reconstitución, ver sección 5 del prospecto.

## **2. ADMINISTRACIÓN**

Perfundir la solución reconstituida por vía intravenosa durante 1 hora.

## **3. ELIMINACIÓN**

Los viales son para un solo uso y se debe desechar cualquier solución sobrante. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.