Prospecto: información para el usuario

Cladribina Zentiva 10 mg comprimidos EFG

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Cladribina Zentiva y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cladribina Zentiva
3. Cómo tomar Cladribina Zentiva
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Cladribina Zentiva
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Cladribina Zentiva y para qué se utiliza

Cladribina Zentiva contiene el principio activo cladribina, una sustancia citotóxica (capaz de matar células) que actúa principalmente sobre los linfocitos, unas células del sistema inmunitario implicadas en la inflamación.

Cladribina Zentiva es un medicamento que se usa para tratar la **esclerosis múltiple** (EM) en los **adultos**. La EM es una enfermedad en la que la inflamación destruye la vaina protectora que rodea los nervios.

Se ha demostrado que el tratamiento con este medicamento reduce el empeoramiento de los síntomas y enlentece la progresión de la discapacidad.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cladribina Zentiva

No tome Cladribina Zentiva
- si es **alérgico** a **cladribina** o a alguno de los **demás componentes** de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si es **positivo para el VIH**, lo que significa que está infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- si tiene una tuberculosis o una inflamación del hígado (hepatitis) activas.
- si tiene un **sistema inmunitario debilitado** debido a enfermedades o porque está **tomando medicamentos que debilitan el sistema inmunitario** o reducen la producción de células sanguíneas en la **médula ósea**. Entre ellos se encuentran:
  - ciclosporina, ciclofosfamida y azatioprina (usados para suprimir el sistema inmunitario, por ejemplo, después de un trasplante de órgano);

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

- metotrexato (usado para tratar afecciones como la psoriasis o la artritis reumatoide);
- corticoesteroides durante un tiempo prolongado (usados para reducir la inflamación, por ejemplo, en el asma).

Consulte también "Otros medicamentos y Cladribina Zentiva".

- si tiene un cáncer activo.
- si tiene **problemas renales moderados o graves**.
- si está **embarazada** o en **período de lactancia** (consulte también "Embarazo y lactancia").

No tome este medicamento y consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas de si se encuentra en alguna de las anteriores circunstancias.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Cladribina Zentiva.

Análisis de sangre

Se le realizarán análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento para comprobar si puede tomar este medicamento. El médico también le realizará análisis de sangre durante y después del tratamiento para comprobar que puede continuar tomando este medicamento y que no está desarrollando ninguna complicación derivada del tratamiento.

Infecciones

Se le realizarán pruebas para comprobar si tiene infecciones antes de iniciar el tratamiento con cladribina. Es importante que consulte a su médico si cree que tiene una infección. Las infecciones podrían ser graves y posiblemente incluso potencialmente mortales. Entre los síntomas de infección pueden encontrarse: fiebre, dolor, dolores musculares, dolor de cabeza, sensación general de malestar o coloración amarillenta de los ojos. Su médico puede retrasar el tratamiento o interrumpirlo hasta que desaparezca la infección.

Herpes zóster

Si es necesario, se le vacunará contra el herpes zóster antes de iniciar el tratamiento. Tendrá que esperar entre 4 y 6 semanas para que la vacuna haga efecto. **Informe a su médico inmediatamente si presenta síntomas de herpes zóster**, una complicación frecuente de este medicamento (ver sección 4), que puede necesitar tratamiento específico.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)

Si cree que la **esclerosis múltiple está empeorando** o **nota cualquier síntoma nuevo**, como, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo o la conducta, lapsus de memoria, dificultades para hablar o comunicarse, **consulte a su médico lo antes posible**. Pueden ser síntomas de un trastorno cerebral raro causado por una infección y llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). La LMP es una afección grave que puede causar una discapacidad importante o la muerte.

Aunque la LMP no se ha observado con cladribina, como medida de precaución, **es posible que se le realice una RM (resonancia magnética) de la cabeza** antes de iniciar el tratamiento.

Cáncer

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Se han observado casos individuales de cáncer en los pacientes que recibieron cladribina en los ensayos clínicos. Consulte a su médico si ha tenido cáncer. Su médico decidirá las mejores opciones de tratamiento para usted. Como medida de precaución, su médico le aconsejará seguir las recomendaciones estándar de pruebas para detectar el cáncer.

Problemas hepáticos

Este medicamento puede causar problemas hepáticos. **Consulte a su médico antes de tomar cladribina si tiene o ha tenido problemas hepáticos. Informe a su médico inmediatamente si desarrolla uno o más de los siguientes síntomas**: ganas de vomitar (náuseas), vómitos, dolor de estómago, cansancio (fatiga), pérdida de apetito, coloración amarilla de la piel o los ojos (ictericia) u orina turbia. Estos pueden ser síntomas de problemas hepáticos graves.

Anticoncepción

Las mujeres deben usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y por lo menos hasta seis meses después de la última dosis. Los hombres deben usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y por lo menos hasta tres meses después de la última dosis. Esto es importante porque este medicamento puede dañar gravemente al bebé.

Ver también “Embarazo y lactancia”.

Transfusiones de sangre

Si necesita transfusiones de sangre, dígale al médico que está tomando cladribina. Puede ser necesario irradiar la sangre para evitar complicaciones.

Cambios de tratamiento

Si cambia de otros tratamientos para la EM a este medicamento, su médico comprobará que sus recuentos de células sanguíneas (linfocitos) sean normales antes de iniciar el tratamiento.

Si cambia de este medicamento a otros tratamientos para la EM, consulte a su médico. Pueden producirse solapamientos en el efecto sobre el sistema inmunitario.

Niños y adolescentes

No se recomienda el uso de cladribina en pacientes menores de 18 años, ya que no se ha estudiado en este grupo de edad.

Otros medicamentos y Cladribina Zentiva

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

No inicie cladribina junto con medicamentos que debilitan su sistema inmunitario o reducen la producción de células sanguíneas en su médula ósea. Estos incluyen:

- ciclosporina, ciclofosfamida y azatioprina (usados para suprimir el sistema inmunitario, por ejemplo, después de un trasplante de órgano).

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

- metotrexato (usado para tratar afecciones como la psoriasis o la artritis reumatoide).
- corticoesteroides durante un tiempo prolongado (usados para reducir la inflamación, por ejemplo, en el asma). Pueden usarse corticoesteroides a corto plazo si el médico lo aconseja.

No use cladribina junto con otros medicamentos para la EM a menos que su médico se lo aconseje específicamente.

No tome cladribina al mismo tiempo que ningún otro medicamento. Deje un intervalo de **por lo menos tres horas** entre la toma de este medicamento y la de otros medicamentos tomados por vía oral. Cladribina contiene hidroxipropilbetadex, que puede interaccionar con otros medicamentos en el estómago.

Consulte a su médico si recibe o ha recibido tratamiento con:

- medicamentos que pueden afectar a las células de la sangre (por ejemplo, carbamazepina, usada para tratar la epilepsia). Tal vez su médico deba supervisarle más estrechamente.

- algunos tipos de vacunas (vacunas vivas o vivas atenuadas). Si le han vacunado en las últimas 4 a 6 semanas, el tratamiento con cladribina debe retrasarse. No debe recibir estas vacunas durante el tratamiento con cladribina. Es necesario que el sistema inmunitario se haya recuperado antes de que se le pueda vacunar y, para comprobar esto, serán necesarios análisis de sangre.

- dilazep, nifedipino, nimodipino, reserpina, cilostazol o sulindaco (usados para tratar enfermedades del corazón, la hipertensión, enfermedades vasculares o inflamatorias) o eltrombopag (usado para tratar enfermedades asociadas a hemorragias). Su médico le dirá qué hacer si tiene que tomar estos medicamentos.

- rifampicina (usada para tratar algunos tipos de infecciones), hierba de San Juan (usada para tratar la depresión) o corticoesteroides (usados para reducir la inflamación). Su médico le dirá qué hacer si tiene que tomar estos medicamentos.

Embarazo y lactancia

No tome cladribina si está embarazada o tratando de quedarse embarazada. Esto es importante porque este medicamento puede dañar gravemente al bebé.

Debe usar **métodos anticonceptivos efectivos** para evitar quedarse embarazada durante el tratamiento con cladribina y por lo menos durante seis meses después de tomar la última dosis. Si se queda embarazada cuando han pasado más de seis meses después de la última dosis del año 1, no se prevén riesgos de seguridad, pero esto significará que no puede recibir tratamiento con este medicamento mientras esté embarazada.

Los hombres deben usar métodos anticonceptivos efectivos mientras estén recibiendo tratamiento con cladribina y durante tres meses después de la última dosis.

Su médico le orientará sobre los métodos anticonceptivos apropiados.

No tome cladribina si está en período de lactancia. Si su médico opina que este medicamento es esencial para usted, le aconsejará que deje la lactancia materna durante el tratamiento y al menos una semana después de la última dosis.

Conducción y uso de máquinas

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

No se prevé que cladribina afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Cladribina Zentiva contiene sorbitol

Este medicamento contiene 64 mg de sorbitol en cada comprimido.

3. Cómo tomar Cladribina Zentiva

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Cursos de tratamiento

Se le administrará este medicamento en forma de **dos cursos de tratamiento** a lo largo de **dos años**.

Cada curso de tratamiento consiste en **dos semanas de tratamiento**, separadas por un mes al inicio de cada año de tratamiento.

Una **semana de tratamiento** consiste en **cuatro o cinco días en los que recibirá uno o dos comprimidos al día (ver la Tabla 1)**.

Por ejemplo: si inicia el tratamiento a mediados de abril, tomará los comprimidos tal como se indica a continuación.

Tabla 1

Año 1		**Año 2**	
1ª semana de tratamiento	1 o 2 comprimidos al día durante 4 o 5 días, a mediados de abril	1ª semana de tratamiento	1 o 2 comprimidos al día durante 4 o 5 días, a mediados de abril
2ª semana de tratamiento	1 o 2 comprimidos al día durante 4 o 5 días, a mediados de mayo	2ª semana de tratamiento	1 o 2 comprimidos al día durante 4 o 5 días, a mediados de mayo

Antes de empezar cada curso de tratamiento, el médico le hará un análisis de sangre para comprobar que los niveles de linfocitos (un tipo de glóbulos blancos) de su organismo están dentro de los límites aceptables. Si éste no fuera el caso, se retrasará el tratamiento.

Una vez completados los dos cursos de tratamiento a lo largo de dos años, su médico seguirá vigilando su salud durante otros dos años, en los que no necesitará tomar el medicamento.

Dosis

1. Se le recetará el número correcto de comprimidos para cada semana de tratamiento, basándose en su peso corporal, tal como se indica en la Tabla 2.
2. Necesitará uno o más envases para proporcionar el número correcto de comprimidos.
3. Cuando reciba el suministro de medicamento, compruebe que tiene el número correcto de comprimidos.
4. En la columna izquierda de la tabla que se muestra más adelante, busque la fila que corresponda a su peso corporal (en kg); luego, compruebe el número de comprimidos que debe haber en el o los envases para la semana de tratamiento que iniciará.
5. Si el número de comprimidos que hay en el o los envases es diferente del número indicado para su peso corporal en la tabla, consulte a su médico.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

6. Observe que, en algunos intervalos de peso, el número de comprimidos puede variar de una semana de tratamiento a la siguiente.

Por ejemplo: si pesa 85 kg y está a punto de comenzar la semana de tratamiento 1, se le entregarán 8 comprimidos.

Tabla 2

Su peso	**Número de comprimidos que debe tomar**			
	Curso de tratamiento del año 1		Curso de tratamiento del año 2	
	Semana de tratamiento 1	Semana de tratamiento 2	Semana de tratamiento 1	Semana de tratamiento 2
menos de 40 kg	Su médico le dirá el número de comprimidos que debe tomar			
40 a menos de 50 kg	4	4	4	4
50 a menos de 60 kg	5	5	5	5
60 a menos de 70 kg	6	6	6	6
70 a menos de 80 kg	7	7	7	7
80 a menos de 90 kg	8	7	8	7
90 a menos de 100 kg	9	8	9	8
100 a menos de 110 kg	10	9	10	9
110 kg o más	10	10	10	10

Cómo tomar el medicamento

Tome los comprimidos aproximadamente a la misma hora cada día. Tráguelos con agua y sin masticarlos. No es necesario tomarlos a la hora de las comidas. Puede tomarlos con las comidas o entre las mismas.

Lea la "Guía paso a paso" al final de este prospecto sobre cómo manipular el embalaje a prueba de niños y cómo tomar los comprimidos incluidos en el envase.

Importante

- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de coger el o los comprimidos.
- Extraiga el o los comprimidos del blíster y tráguelos inmediatamente.
- No deje su(s) comprimido(s) expuesto(s) sobre superficies, por ejemplo, sobre una mesa, ni manipule el comprimido más tiempo del necesario.
- Si se deja un comprimido sobre una superficie o si se rompe y los fragmentos caen del blíster, la zona debe limpiarse bien.
- Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.
- Si pierde un comprimido, consulte a su médico.

Duración de una semana de tratamiento

Dependiendo del número total de comprimidos que se le haya recetado, tendrá que tomarlos a lo largo de 4 o 5 días, en cada semana de tratamiento.

La Tabla 3 muestra cuántos comprimidos (1 o 2 comprimidos) debe tomar cada día. Si su dosis diaria son 2 comprimidos, tómelos al mismo tiempo.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Por ejemplo: si tiene que tomar 8 comprimidos, tomaría **2 comprimidos** el Día 1, el Día 2 y el Día 3 y, a partir de entonces, **1 comprimido** el Día 4 y el Día 5.

Tabla 3

Número total de comprimidos por semana de tratamiento	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
4	1	1	1	1	0
5	1	1	1	1	1
6	2	1	1	1	1
7	2	2	1	1	1
8	2	2	2	1	1
9	2	2	2	2	1
10	2	2	2	2	2

Si toma más Cladribina Zentiva del que debe

Si ha tomado más comprimidos de los que debe, póngase en contacto inmediatamente con su médico. Su médico decidirá si es necesario o no que interrumpa el tratamiento.

Existe experiencia limitada con la sobredosis de este medicamento. Se sabe que cuanto más medicamento tome, menor puede ser el número de linfocitos presentes en su organismo, lo que da lugar a linfopenia (ver sección 4).

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Cladribina Zentiva

Si se le olvida tomar una dosis y se acuerda el mismo día en que debía haberla tomado	Si se le olvida tomar una dosis y no se acuerda hasta el día siguiente
Tome la dosis olvidada ese día.	No tome la dosis olvidada junto con la siguiente dosis programada. Tome la dosis olvidada al día siguiente y amplíe el número de días de esa semana de tratamiento.

Por ejemplo: Si olvidó tomar la dosis del Día 3 y no lo recuerda hasta el Día 4, tome la dosis del Día 3 en el Día 4, y amplíe en un día el número total de días de la semana de tratamiento. Si olvida dos dosis consecutivas (por ejemplo, las dosis de los Días 3 y 4), tome las dosis olvidadas los dos días siguientes, y luego amplíe en dos días la semana de tratamiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Algunos efectos adversos pueden ser graves o llegar a ser graves

Linfopenia y herpes zóster (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

El efecto adverso más importante es una disminución del número de glóbulos blancos llamados linfocitos (**linfopenia**), que es muy frecuente y puede ser grave. La linfopenia puede aumentar el riesgo de contraer una infección. Una infección frecuentemente observada con cladribina es el **herpes zóster**.

Informe a su médico inmediatamente si presenta síntomas de herpes zóster, como una "banda" de dolor intenso y una erupción cutánea con ampollas, habitualmente en un lado de la parte superior del cuerpo o la cara. Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza, escozor, hormigueos, adormecimiento o picor en la piel de la zona afectada, sensación general de malestar o de fiebre en las etapas iniciales de la infección.

El herpes zóster necesitará tratamiento y tal vez deba interrumpirse el tratamiento con cladribina hasta que la infección desaparezca.

Problemas hepáticos (poco frecuentes - pueden afectar hasta a 1 de cada 100 personas)

Informe a su médico inmediatamente si presenta síntomas como ganas de vomitar (náuseas), vómitos, dolor de estómago, cansancio (fatiga), pérdida de apetito, coloración amarilla de la piel o los ojos (ictericia) u orina turbia. Puede ser necesario interrumpir o suspender el tratamiento con cladribina.

Otros posibles efectos adversos

Frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 personas)
- calenturas (herpes oral)
- erupción cutánea
- caída del cabello
- disminución del número de ciertos glóbulos blancos (neutrófilos)
- reacciones alérgicas, incluyendo picazón, ronchas, erupción cutánea e hinchazón de los labios, la lengua o la cara

Muy raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 000 personas)
- tuberculosis

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Cladribina Zentiva

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el estuche y blíster después de "EXP". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Cladribina Zentiva

- El principio activo es cladribina. Cada comprimido contiene 10 mg de cladribina.
- Los demás componentes son hidroxipropilbetadex, sorbitol (E420) y estearato de magnesio (E470b).

Aspecto del producto y contenido del envase

Los comprimidos de cladribina son comprimidos blancos, redondos, biconvexos, grabados con "10" en una cara y con diámetro de 8,5 mm.

Cada envase contiene 1, 4, 6 o 10 comprimidos en blísteres colocados en un soporte transparente y encajado en un estuche exterior a prueba de niños.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

Titular de la autorización de comercialización
Zentiva, k.s.
U kabelovny 130,
Dolní Mecholupy,
102 37 Praga 10,
República Checa

Responsable de la fabricación
PharOS MT Limited
Hf62x, Qasam Industrijali Hal Far, Hal
Far, Birzebbuga, BBG 3000, Malta

O

PharOS-Pharmaceutical Oriented
Services Ltd
Lesvou str. (end), Thesi Loggos, Industrial
Zone 14452 Metamorfossi Attikis, Grecia

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:
Zentiva Spain S.L.U.
Avenida de Europa, 19, Edificio 3, Planta 1.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios


28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
España

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:
Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Francia: Cladribine Zentiva
Croacia: Kladribin Zentiva
Rumanía: Cladribină Zentiva
Portugal, Italia: Cladribina Zentiva
España: Cladribina Zentiva 10 mg comprimidos EFG
Alemania: Cladribin zentiva
Fecha de la última revisión de este prospecto: agosto 2026

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (http://www.aemps.gob.es/)


Guía paso a paso para tomar Cladribina Zentiva 10 mg comprimidos EFG

Cladribina Zentiva está colocada en un soporte transparente de APET (tereftalato de polietileno amorfo) y encajado en un estuche exterior a prueba de niños y debe mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños. Consulte más abajo la guía paso a paso sobre cómo manipular el embalaje y cómo tomar los comprimidos de cladribina. Asegúrese de que sabe cuántos comprimidos contiene el embalaje. Consulte las directrices en el prospecto.




1. Tenga un vaso de agua listo y asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tomar el o los comprimidos.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios



2. Coja la caja con las instrucciones de apertura hacia arriba.



3. (1) Abra la solapa del extremo izquierdo y
   (2) Presione hacia dentro los ganchos de los lados de la caja simultáneamente con el índice y el pulgar y mantenga los ganchos apretados.
   (3) Tire de la bandeja hacia fuera hasta que se detenga. **Precaución:** no extraiga la bandeja de la caja.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios



4. Saque el prospecto de la bandeja. Asegúrese de que ha leído todo el prospecto, incluida esta guía paso a paso, y guárdelo en un lugar seguro.




5. Dé la vuelta a la bandeja para que el blíster se desprenda de ella. Coloque la mano bajo el envase blíster y empuje 1 o 2 comprimidos hacia su mano, según la dosis recetada.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios




6. Trague el o los comprimidos con agua. Los comprimidos deben tragarse enteros y no se deben masticar ni dejar que se disuelvan en la boca. El contacto con la piel debe ser limitado. Evite tocarse la nariz, los ojos y otras partes del cuerpo.



7. Lávese bien las manos con agua y jabón.

MINISTERIO DE
SANIDAD, POLITICA
SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios



8. Vuelva a empujar la bandeja al interior de la caja.

Conserve los comprimidos en el blíster hasta la siguiente dosis. No extraiga los comprimidos del blíster. No guarde los comprimidos en un envase diferente.

MINISTERIO DE
SANIDAD, POLITICA
SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios