Prospecto: información para el usuario

Cladribina Sandoz 10 mg comprimidos EFG

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Cladribina Sandoz y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cladribina Sandoz
3. Cómo tomar Cladribina Sandoz
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Cladribina Sandoz
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Cladribina Sandoz y para qué se utiliza

Cladribina Sandoz contiene el principio activo cladribina, una sustancia citotóxica (capaz de matar células) que actúa principalmente sobre los linfocitos, unas células del sistema inmunitario implicadas en la inflamación.

Cladribina es un medicamento que se usa para tratar la **esclerosis múltiple** en los **adultos**. La esclerosis múltiple es una enfermedad en la que la inflamación destruye la vaina protectora que rodea los nervios.

Se ha demostrado que el tratamiento con cladribina reduce el empeoramiento de los síntomas y enlentece la progresión de la discapacidad.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cladribina Sandoz

No tome Cladribina Sandoz

- si es **alérgico** a la **cladribina** o a alguno de los **demás componentes** de este medicamento (incluidos en la sección 6),
- si es **positivo para el VIH**, lo que significa que está infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

- si tiene una tuberculosis o una inflamación del hígado (hepatitis) activas,
- si tiene un **sistema inmunitario debilitado** debido a enfermedades o porque está **tomando medicamentos que debilitan el sistema inmunitario** o reducen la producción de células sanguíneas en la **médula ósea**. Entre ellos se encuentran:
  - ciclosporina, ciclofosfamida y azatioprina (usados para suprimir el sistema inmunitario, por ejemplo, después de un trasplante de órgano);
  - metotrexato (usado para tratar afecciones como la psoriasis o la artritis reumatoide);
  - corticoesteroides durante un tiempo prolongado (usados para reducir la inflamación, por ejemplo, en el asma).

  Consulte también "Otros medicamentos y Cladribina Sandoz".
- si tiene un cáncer activo,
- si tiene **problemas renales moderados o graves**,
- si está **embarazada** o en **período de lactancia** (consulte también "Embarazo y lactancia").

No tome Cladribina Sandoz y consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas de si se encuentra en alguna de las anteriores circunstancias.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Cladribina Sandoz.

Análisis de sangre
Se le realizarán análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento para comprobar si puede tomar este medicamento. El médico también le realizará análisis de sangre durante y después del tratamiento para comprobar que puede continuar tomando cladribina y que no está desarrollando ninguna complicación derivada del tratamiento.

Infecciones
Se le realizarán pruebas para comprobar si tiene infecciones antes de iniciar el tratamiento con cladribina. Es importante que consulte a su médico si cree que tiene una infección. Las infecciones podrían ser graves y posiblemente incluso potencialmente mortales. Entre los síntomas de infección pueden encontrarse: fiebre, dolor, dolores musculares, dolor de cabeza, sensación general de malestar o coloración amarillenta de los ojos. Su médico puede retrasar el tratamiento o interrumpirlo hasta que desaparezca la infección.

Herpes zóster
Si es necesario, se le vacunará contra el herpes zóster antes de iniciar el tratamiento. Tendrá que esperar entre 4 y 6 semanas para que la vacuna haga efecto. **Informe a su médico inmediatamente si presenta síntomas de herpes zóster**, una complicación frecuente de cladribina (ver sección 4), que puede necesitar tratamiento específico.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Si cree que la **esclerosis múltiple está empeorando** o **nota cualquier síntoma nuevo**, como, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo o la conducta, lapsus de memoria, dificultades para hablar o comunicarse, **consulte a su médico lo antes posible**. Pueden ser síntomas de un trastorno cerebral raro causado por una infección y llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una afección grave que puede causar una discapacidad importante o la muerte.

Aunque la leucoencefalopatía multifocal progresiva no se ha observado con cladribina, como medida de precaución, **es posible que se le realice una resonancia magnética de la cabeza** antes de iniciar el tratamiento.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Cáncer
Se han observado casos individuales de cáncer en los pacientes que recibieron cladribina en los ensayos clínicos. Consulte a su médico si ha tenido cáncer. Su médico decidirá las mejores opciones de tratamiento para usted. Como medida de precaución, su médico le aconsejará seguir las recomendaciones estándar de pruebas para detectar el cáncer.

Problemas hepáticos
Cladribina puede causar problemas hepáticos. **Consulte a su médico antes de tomar cladribina si tiene o ha tenido problemas hepáticos. Informe a su médico inmediatamente si desarrolla uno o más de los siguientes síntomas**: ganas de vomitar (náuseas), vómitos, dolor de estómago, cansancio (fatiga), pérdida de apetito, coloración amarilla de la piel o los ojos (ictericia) u orina turbia. Estos pueden ser síntomas de problemas hepáticos graves.

Anticoncepción
Las mujeres deben usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y por lo menos hasta seis meses después de la última dosis. Los hombres deben usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y por lo menos hasta tres meses después de la última dosis. Esto es importante porque cladribina puede dañar gravemente al bebé.

Ver también “Embarazo y lactancia”.

Transfusiones de sangre
Si necesita transfusiones de sangre, dígale al médico que está tomando cladribina. Puede ser necesario irradiar la sangre para evitar complicaciones.

Cambios de tratamiento
Si cambia de otros tratamientos para la esclerosis múltiple a cladribina, su médico comprobará que sus recuentos de células sanguíneas (linfocitos) sean normales antes de iniciar el tratamiento.

Si cambia de Cladribina Sandoz a otros tratamientos para la esclerosis múltiple, consulte a su médico. Pueden producirse solapamientos en el efecto sobre el sistema inmunitario.

Niños y adolescentes
No se recomienda el uso de Cladribina Sandoz en pacientes menores de 18 años, ya que no se ha estudiado en este grupo de edad.

Otros medicamentos y Cladribina Sandoz

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

No inicie cladribina junto con medicamentos que debilitan su sistema inmunitario o reducen la producción de células sanguíneas en su médula ósea. Estos incluyen:

- ciclosporina, ciclofosfamida y azatioprina (usados para suprimir el sistema inmunitario, por ejemplo, después de un trasplante de órgano),
- metotrexato (usado para tratar afecciones como la psoriasis o la artritis reumatoide),
- corticoesteroides durante un tiempo prolongado (usados para reducir la inflamación, por ejemplo, en el asma). Pueden usarse corticoesteroides a corto plazo si el médico lo aconseja.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

No use cladribina junto con otros medicamentos para la esclerosis múltiple a menos que su médico se lo aconseje específicamente.

No tome cladribina al mismo tiempo que ningún otro medicamento. Deje un intervalo de **por lo menos tres horas** entre la toma de cladribina y la de otros medicamentos tomados por vía oral. Cladribina contiene hidroxipropilbetadex, que puede interaccionar con otros medicamentos en el estómago.

Consulte a su médico si recibe o ha recibido tratamiento con:

- medicamentos que pueden afectar a las células de la sangre (por ejemplo, carbamazepina, usada para tratar la epilepsia). Tal vez su médico deba supervisarle más estrechamente,

- algunos tipos de vacunas (vacunas vivas o vivas atenuadas). Si le han vacunado en las últimas 4 a 6 semanas, el tratamiento con cladribina debe retrasarse. No debe recibir estas vacunas durante el tratamiento con cladribina. Es necesario que el sistema inmunitario se haya recuperado antes de que se le pueda vacunar y, para comprobar esto, serán necesarios análisis de sangre,

- dilazep, nifedipino, nimodipino, reserpina, cilostazol o sulindaco (usados para tratar enfermedades del corazón, la hipertensión, enfermedades vasculares o inflamatorias) o eltrombopag (usado para tratar enfermedades asociadas a hemorragias). Su médico le dirá qué hacer si tiene que tomar estos medicamentos,

- rifampicina (usada para tratar algunos tipos de infecciones), hierba de San Juan (usada para tratar la depresión) o corticoesteroides (usados para reducir la inflamación). Su médico le dirá qué hacer si tiene que tomar estos medicamentos.

Embarazo y lactancia

No tome cladribina si está embarazada o tratando de quedarse embarazada. Esto es importante porque cladribina puede dañar gravemente al bebé.

Debe usar **métodos anticonceptivos efectivos** para evitar quedarse embarazada durante el tratamiento con cladribina y por lo menos durante seis meses después de tomar la última dosis. Si se queda embarazada cuando han pasado más de seis meses después de la última dosis del año 1, no se prevén riesgos de seguridad, pero esto significará que no puede recibir tratamiento con cladribina mientras esté embarazada.

Los hombres deben usar métodos anticonceptivos efectivos mientras estén recibiendo tratamiento con cladribina y durante tres meses después de la última dosis.

Su médico le orientará sobre los métodos anticonceptivos apropiados.

No tome cladribina si está en período de lactancia. Si su médico opina que cladribina es esencial para usted, le aconsejará que deje la lactancia materna durante el tratamiento y al menos una semana después de la última dosis.

Conducción y uso de máquinas
No se prevé que cladribina afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Cladribina Sandoz contiene sorbitol

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Este medicamento contiene 64 mg de sorbitol en cada comprimido.

3. Cómo tomar Cladribina Sandoz

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Cursos de tratamiento

Se le administrará Cladribina en forma de **dos cursos de tratamiento** a lo largo de **dos años**.

Cada curso de tratamiento consiste en **dos semanas de tratamiento**, separadas por un mes al inicio de cada año de tratamiento.

Una **semana de tratamiento** consiste en **cuatro o cinco días en los que recibirá uno o dos comprimidos al día (ver la Tabla 1)**.

Por ejemplo: si inicia el tratamiento a mediados de abril, tomará los comprimidos tal como se indica a continuación.

Tabla 1

Año 1		**Año 2**	
1ª semana de tratamiento	Uno o dos comprimidos al día durante cuatro o cinco días, a mediados de abril	1ª semana de tratamiento	Uno o dos comprimidos al día durante cuatro o cinco días, a mediados de abril
2ª semana de tratamiento	Uno o dos comprimidos al día durante cuatro o cinco días, a mediados de mayo	2ª semana de tratamiento	Uno o dos comprimidos al día durante cuatro o cinco días, a mediados de mayo

Antes de empezar cada curso de tratamiento, el médico le hará un análisis de sangre para comprobar que los niveles de linfocitos (un tipo de glóbulos blancos) de su organismo están dentro de los límites aceptables. Si éste no fuera el caso, se retrasará el tratamiento.

Una vez completados los dos cursos de tratamiento a lo largo de dos años, su médico seguirá vigilando su salud durante otros dos años, en los que no necesitará tomar el medicamento.

Dosis

1. Se le recetará el número correcto de comprimidos para cada semana de tratamiento, basándose en su peso corporal, tal como se indica en la Tabla 2.
2. Necesitará uno o más envases para proporcionar el número correcto de comprimidos.
3. Cuando reciba el suministro de medicamento, compruebe que tiene el número correcto de comprimidos.
4. En la columna izquierda de la tabla que se muestra más adelante, busque la fila que corresponda a su peso corporal (en kg); luego, compruebe el número

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

de comprimidos que debe haber en el o los envases para la semana de tratamiento que iniciará.

5. Si el número de comprimidos que hay en el o los envases es diferente del número indicado para su peso corporal en la tabla, consulte a su médico.
6. Observe que, en algunos intervalos de peso, el número de comprimidos puede variar de una semana de tratamiento a la siguiente.

Por ejemplo: si pesa 85 kg y está a punto de comenzar la semana de tratamiento 1, se le entregarán 8 comprimidos.

Tabla 2

Su peso	**Número de comprimidos que debe tomar**			
	Curso de tratamiento del año 1		Curso de tratamiento del año 2	
	Semana de tratamiento 1	Semana de tratamiento 2	Semana de tratamiento 1	Semana de tratamiento 2
menos de 40 kg	Su médico le dirá el número de comprimidos que debe tomar			
40 a menos de 50 kg	4	4	4	4
50 a menos de 60 kg	5	5	5	5
60 a menos de 70 kg	6	6	6	6
70 a menos de 80 kg	7	7	7	7
80 a menos de 90 kg	8	7	8	7
90 a menos de 100 kg	9	8	9	8
100 a menos de 110 kg	10	9	10	9
110 kg o más	10	10	10	10

Cómo tomar el medicamento

Tome los comprimidos aproximadamente a la misma hora cada día. Tráguelos con agua y sin masticarlos. No es necesario tomarlos a la hora de las comidas. Puede tomarlos con las comidas o entre las mismas.

Lea la "Guía paso a paso" al final de este prospecto sobre cómo manipular el embalaje a prueba de niños y cómo tomar los comprimidos incluidos en el envase.

Importante

- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de coger el o los comprimidos.
- Extraiga el o los comprimidos del blíster y tráguelos inmediatamente.
- No deje su(s) comprimido(s) expuesto(s) sobre superficies, por ejemplo, sobre una mesa, ni manipule el comprimido más tiempo del necesario.
- Si se deja un comprimido sobre una superficie o si se rompe y los fragmentos caen del blíster, la zona debe limpiarse bien.
- Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.
- Si pierde un comprimido, consulte a su médico.

Duración de una semana de tratamiento

Dependiendo del número total de comprimidos que se le haya recetado, tendrá que tomarlos a lo largo de cuatro o cinco días, en cada semana de tratamiento.
La Tabla 3 muestra cuántos comprimidos (uno o dos comprimidos) debe tomar cada día. Si su dosis diaria son dos comprimidos, tómelos al mismo tiempo.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Por ejemplo: si tiene que tomar ocho comprimidos, tomaría **dos comprimidos** el día 1, el día 2 y el día 3 y, a partir de entonces, **un comprimido** el día 4 y el día 5.

Tabla 3

Número total de comprimidos por semana de tratamiento	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
4	1	1	1	1	0
5	1	1	1	1	1
6	2	1	1	1	1
7	2	2	1	1	1
8	2	2	2	1	1
9	2	2	2	2	1
10	2	2	2	2	2

Si toma más Cladribina Sandoz del que debe

Si ha tomado más comprimidos de los que debe, póngase en contacto inmediatamente con su médico. Su médico decidirá si es necesario o no que interrumpa el tratamiento.

Existe experiencia limitada con la sobredosis de cladribina. Se sabe que cuanto más medicamento tome, menor puede ser el número de linfocitos presentes en su organismo, lo que da lugar a linfopenia (ver sección 4).

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Cladribina Sandoz

Si se le olvida tomar una dosis y se acuerda el mismo día en que debía haberla tomado	Si se le olvida tomar una dosis y no se acuerda hasta el día siguiente
Tome la dosis olvidada ese día.	No tome la dosis olvidada junto con la siguiente dosis programada. Tome la dosis olvidada al día siguiente y amplíe el número de días de esa semana de tratamiento.

Por ejemplo: Si olvidó tomar la dosis del día 3 y no lo recuerda hasta el día 4, tome la dosis del día 3 en el día 4, y amplíe en un día el número total de días de la semana de tratamiento. Si olvida dos dosis consecutivas (por ejemplo, las dosis de los días 3 y 4), tome las dosis olvidadas los dos días siguientes, y luego amplíe en dos días la semana de tratamiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Algunos efectos adversos pueden ser graves o llegar a ser graves

Linfopenia y herpes zóster (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

El efecto adverso más importante es una disminución del número de glóbulos blancos llamados linfocitos (**linfopenia**), que es muy frecuente y puede ser grave. La linfopenia puede aumentar el riesgo de contraer una infección. Una infección frecuentemente observada con cladribina es el **herpes zóster**.

Informe a su médico inmediatamente si presenta síntomas de herpes zóster, como una "banda" de dolor intenso y una erupción cutánea con ampollas, habitualmente en un lado de la parte superior del cuerpo o la cara. Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza, escozor, hormigueos, adormecimiento o picor en la piel de la zona afectada, sensación general de malestar o de fiebre en las etapas iniciales de la infección.

El herpes zóster necesitará tratamiento y tal vez deba interrumpirse el tratamiento con cladribina hasta que la infección desaparezca.

Problemas hepáticos (poco frecuentes [pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas])

Informe a su médico inmediatamente si presenta síntomas como ganas de vomitar (náuseas), vómitos, dolor de estómago, cansancio (fatiga), pérdida de apetito, coloración amarilla de la piel o los ojos (ictericia) u orina turbia. Puede ser necesario interrumpir o suspender el tratamiento con cladribina.

Otros posibles efectos adversos

Frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas)
- calenturas (herpes oral),
- erupción cutánea,
- caída del cabello,
- disminución del número de ciertos glóbulos blancos (neutrófilos),
- reacciones alérgicas, incluyendo picazón, ronchas, erupción cutánea e hinchazón de los labios, la lengua o la cara.

Muy raros (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 000 personas)
- tuberculosis.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

5. Conservación de Cladribina Sandoz

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el blíster después de "CAD/EXP". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Cladribina Sandoz

- El principio activo es cladribina. Cada comprimido contiene 10 mg de cladribina.
- Los demás componentes son hidroxipropilbetadex, sorbitol (E420) y estearato de magnesio (E470b).

Aspecto del producto y contenido del envase
Los comprimidos de Cladribina Sandoz son comprimidos blancos, redondos, biconvexos, grabados con "10" en una cara con un diámetro de 8,5 mm.

Cada envase contiene 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 comprimidos en un blíster colocado en unsoporte transparente fijado dentro de un estuche a prueba de niños.

Cada envase contiene 4x1, 5x1, 6x1, 7x1, 8x1, 10x1, 12x1 o 14x1 comprimidos en un blíster unidosis colocado en una bandeja transparente fijada dentro de un estuche a prueba de niños.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular de la autorización de comercialización
Sandoz Farmacéutica, S.A.
Centro Empresarial Parque Norte
Edificio Roble
C/ Serrano Galvache, 56
28033 Madrid
España

Responsable de la fabricación
Lek Pharmaceuticals d.d.,
Trimlini 2D, 9220
Lendava,
Eslovenia

ó

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Salutas Pharma GmbH,
Otto-von-Guericke-Allee 1,
Sachsen-Anhalt,
39179 Barleben,
Alemania


Fecha de la última revisión de este prospecto: 08/2026.

Otras fuentes de información


La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/

Guía paso a paso para tomar Cladribina Sandoz 10 mg comprimidos

Cladribina Sandoz se presenta en un soporte transparente de APET (tereftalato de polietileno amorfo) fijada dentro de un estuche a prueba de niños y debe mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños. Consulte más abajo la guía paso a paso sobre cómo manipular el embalaje y cómo tomar los comprimidos de Cladribina Sandoz. Asegúrese de que sabe cuántos comprimidos contiene el embalaje. Consulte las directrices en el prospecto.




1. Tenga un vaso de agua listo y asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tomar el o los comprimidos.




2. Coja la caja con las instrucciones de apertura hacia arriba.


AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS



3. (1) Abra la solapa del extremo izquierdo.
(2) Presione hacia dentro las pestañas de bloqueo de los lados de la caja simultáneamente con el índice y el pulgar y mantenga las pestañas de bloqueo apretadas.
(3) Tire de la bandeja hacia fuera hasta que se detenga.
Precaución: no extraiga la bandeja de la caja.



4. Saque el prospecto de la bandeja. Asegúrese de que lo ha leído todo, incluida esta guía paso a paso, y guárdelo en un lugar seguro.




5. Levante el envase blíster metiendo el dedo a través del agujero de la bandeja. Coloque la mano bajo el envase blíster y empuje uno o dos comprimidos hacia su mano, según la dosis recetada.




6. Trague el o los comprimidos con agua. Los comprimidos deben tragarse enteros y no se deben masticar ni dejar que se disuelvan en la boca. El contacto con la piel debe ser limitado. Evite tocarse la nariz, los ojos y otras partes del cuerpo.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS



7. Lávese bien las manos con agua y jabón.



8. Vuelva a empujar la bandeja al interior de la caja.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

Conserve los comprimidos en el blíster hasta la siguiente dosis. No extraiga los comprimidos del blíster. No guarde los comprimidos en un envase diferente.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS