Prospecto: información para el usuario

Nexalcol 96º solución cutánea
alcohol 96º

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días.

Contenido del prospecto

1. Qué es Nexalcol 96º y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Nexalcol 96º
3. Cómo usar Nexalcol 96º
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Nexalcol 96º
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Nexalcol 96º y para qué se utiliza

Nexalcol 96º es un antiséptico que se emplea para la desinfección de la piel. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Nexalcol 96º

No use Nexalcol 96º
- Si es alérgico al alcohol.
- No aplicar sobre heridas profundas y extensas, ni mucosas.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Nexalcol **96º**. No aplicar sobre heridas profundas y extensas.

En recién nacidos (bebés prematuros y recién nacidos a término), las concentraciones elevadas de etanol pueden producir reacciones locales graves y toxicidad sistémica debido a una absorción significativa a través de la piel inmadura, especialmente cuando se utilizan cantidades elevadas o bajo oclusión.

Proteger del calor. Fácilmente inflamable. Mantener el recipiente bien cerrado.
No utilice este medicamento cerca de una llama, de cigarrillos encendidos o de algunos dispositivos (por ejemplo, secadores de pelo).
No poner en contacto con las mucosas, es muy irritante.
El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel. Puede producir dermatitis de contacto.

Evitar el contacto con los ojos. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario.

La solución es inflamable.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

El riesgo de incendio es alto cuando se usa una fuente de ignición (unidades electroquirúrgicas, láseres, fuentes de luz de fibra óptica, brocas/fresas de alta velocidad…) en combinación con el uso de una fuente de combustión (como paños, toallas…) y el uso de un oxidante (oxígeno, aire, óxido nitroso…).

Para reducir el riesgo de incendio:
- No utilizar procedimientos de electrocauterización u otras fuentes de ignición hasta que la piel esté completamente seca.
- Retirar cualquier material empapado, gasas o batas antes de comenzar con la intervención.
- No usar cantidades excesivas y evitar que la solución se acumule en los pliegues de la piel, bajo el paciente o que empape las sábanas u otro material en contacto directo con el paciente.
- Cuando se aplique vendaje oclusivo a las zonas previamente expuestas a Nexalcol 96%, se debe de tener especial cuidado de que no haya exceso de producto antes de colocar el vendaje.
- Reducir el aporte de oxígeno o cualquier otro oxidante al mínimo necesario. Aquellos procedimientos que se realicen en la cabeza, cuello y la parte superior del pecho (por encima de T5) y el uso de una fuente de ignición cerca de un oxidante ponen al paciente en riesgo de sufrir un incendio quirúrgico.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas
La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

3. Cómo usar Nexalcol 96º

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.
Uso cutáneo. Solo para uso externo. NO INGERIR.

Aplicar directamente sobre el área a tratar. Dejar actuar 2 minutos antes de cada procedimiento. Se recomienda lavar las manos después de cada aplicación.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Si usa más Nexalcol 96º del que debe
En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento, puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel. Puede producir dermatitis de contacto.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Nexalcol 96º

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Inflamable. Evitar la exposición del frasco y de su contenido a llamas abiertas durante el uso, almacenamiento y eliminación del producto.

No requiere condiciones especiales de conservación.
Es fácilmente inflamable.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües, ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Nexalcol 96º
El principio activo es etanol 96% (alcohol 96º). Cada ml de solución contiene un ml de etanol al 96% (alcohol 96º). Cada 100 ml de solución contiene 100 ml de etanol al 96% (alcohol 96º).

Aspecto del producto y contenido del envase
- Frasco de 250 ml de HDPE semitransparente. Tapón bisagra con obturador del PP.
- Frasco de 500 ml de HDPE semitransparente. Tapón bisagra con obturador del PP.

Información adicional
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
West Química Europa
Carretera de Torrejón a Ajalvir Km 5,200
28864
Ajalvir (Madrid)
España

Fecha de la última revisión de este prospecto: Octubre 2026

Otras fuentes información
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS