Prospecto: información para el paciente

Condrosulf 800 mg comprimidos
Condroitina sulfato sodio

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted,y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Condrosulf y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Condrosulf
3. Cómo tomar Condrosulf
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Condrosulf
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Condrosulf y para qué se utiliza

Condrosulf contiene el principio activo condroitina sulfato.
Condrosulf es un medicamento que pertenece al grupo de otros antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.
Está indicado para el tratamiento sintomático de la artrosis de rodilla.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Condrosulf

No tome Condrosulf:
- si es alérgico a condroitína sulfato o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Condrosulf si:
- padece o ha padecido alteraciones o insuficiencia hepática, renal o cardiaca.

Niños y adolescentes
No se recomienda el uso de este medicamento en niños y adolescentes menores de 18 años.

Otros medicamentos y Condrosulf

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, en particular en caso de uso concomitante de anticoagulantes cumarínicos.

Condrosulf con alimentos y bebidas
Ver sección 3 «Cómo tomar Condrosulf».

Embarazo, lactancia y fertilidad
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo o la lactancia.

Conducción y uso de máquinas
La influencia de condroitina sulfato sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas es pequeña. Este medicamento puede causar mareos tras su administración (ver sección 4). Si es su caso, no conduzca ni utilice máquinas.

Condrosulf 800 mg comprimidos contiene sodio
Este medicamento contiene un total de 73 mg de sodio (componente principal de la sal de mesa/para cocinar) en cada comprimido. Esto equivale al 3,8% de la ingesta diaria máxima de sodio recomendada para un adulto.

3. Cómo tomar Condrosulf

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Adultos
La dosis recomendada es de 1 comprimido al día.

Debe ajustarse la duración del tratamiento según la respuesta clínica. El medicamento puede administrarse durante 3 meses, seguido de un periodo sin tratamiento de 2 meses, ya que este medicamento presenta un inicio de acción retardado y sus efectos persisten después de interrumpir el tratamiento.

Uso en niños y adolescentes menores de 18 años
No se recomienda el uso de este medicamento en niños y adolescentes menores de 18 años.

Pacientes de edad avanzada y con insuficiencia renal, hepática y cardiaca
Es necesario extremar las precauciones al tratar a pacientes con insuficiencia renal, hepática y cardiaca (ver sección «Advertencias y precauciones»).

Instrucciones de uso
El comprimido puede tomarse antes, durante o después de la comida. El comprimido se debe tragar entero, sin masticar, con una cantidad suficiente de líquido.

Si toma más Condrosulf del que debe
Si toma una cantidad excesiva de este medicamento, consulte a su médico o vaya a un hospital inmediatamente. Recuerde llevar siempre con usted el envase del medicamento.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Condrosulf
Si olvida una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Sin embargo, si falta poco tiempo para tomar la siguiente dosis, sáltese la dosis olvidada. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Condrosulf
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Algunos efectos adversos pueden ser graves.

A continuación, se enumeran los efectos adversos comunicados con las siguientes frecuencias:

Raros (pueden afectar a hasta 1 de cada 1 000 personas)
- Alteración gastrointestinal, como dolor de estómago, náuseas o diarrea
- Enrojecimiento de la piel
- Erupción

Muy raros (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 000 personas)
- Mareo
- Urticaria
- Picor
- Eczema
- Reacción alérgica
- Hinchazón

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.noticaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Condrosulf

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad (CAD) que aparece en la caja. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 25 °C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Condrosulf

El principio activo es condroitina sulfato. Cada comprimido contiene 800 mg de condroitín sulfato sódico.
El otro componente es estearato de magnesio.

Aspecto del producto y contenido del envase

Comprimidos oblongos biconvexos de unos 21 mm, de color blanco a casi blanco.
Las cajas contienen 30 o 90 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

IBSA Farmaceutici Italia srl
Via Martiri di Cefalonia 2
26900 Lodi,
ITALIA

Fecha de la última revisión de este prospecto: 09/2026

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS