

▼ Adalgur 500 mg/2 mg comprimidos (paracetamol asociado a tiocolchicósido)

FOLLETO DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A MUJERES EN EDAD FÉRTIL

Adalgur es un medicamento compuesto por un analgésico (paracetamol) y un relajante muscular (tiocolchicósido).

Se sabe que el tiocolchicósido es un agente teratogénico (es decir, que puede ocasionar malformaciones en el feto) en animales, por lo que cabe esperar que también pueda serlo en humanos. Existe un riesgo alto de que si se administra a mujeres embarazadas pueda provocar, además de las malformaciones que acaban de mencionarse, aborto, parto prematuro o muerte del recién nacido. Es por este motivo que no deben tomar Adalgur:

- Ni las mujeres que estén embarazadas.
- Ni las mujeres que puedan quedarse embarazadas (es decir mujeres fértiles) que no estén utilizando métodos anticonceptivos eficaces.

Su médico le asesorará acerca del método anticonceptivo más adecuado para usted y le indicará el tiempo que deberá estar adaptándolo. Para mayor seguridad, las pacientes fértiles que tomen Adalgur deberán utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y también durante un tiempo después de haber finalizado el mismo.

Si mientras usted está tomando Adalgur se queda embarazada (o sospecha que se ha podido quedar embarazada, aunque no esté totalmente segura de ello), deberá dejar de tomar el medicamento y ponerse en contacto inmediatamente con su médico.

Para una información más detallada lea el prospecto de Adalgur. En caso de duda o de necesitar información adicional pregunte a su médico o farmacéutico.

Asimismo, si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) agosto 2018

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.