



RECORDATORIO DE CITAS PARA LAS ANALÍTICAS DE SANGRE

Recuerde que deberá realizarse análisis de sangre de forma periódica. La siguiente tabla le ayudará a llevar un seguimiento de las citas

AGOMELATINA 25 MG – FECHA DE LA PRIMERA TOMA:

Intervalos de análisis de sangre para medir enzimas hepáticas **Fecha**

Fecha del primer análisis (al inicio)	
Fecha del segundo análisis (tras aproximadamente 3 semanas)	
Fecha del tercer análisis (tras aproximadamente 6 semanas)	
Fecha del cuarto análisis (tras aproximadamente 3 meses)	
Fecha del quinto análisis (tras aproximadamente 6 meses)	

AUMENTO DE DOSIS A 50 MG – FECHA DE LA PRIMERA TOMA:

Intervalos de análisis de sangre para medir enzimas hepáticas **Fecha**

Fecha de la analítica al inicio del tratamiento con Agomelatina	
Fecha del segundo análisis (tras aproximadamente 3 semanas)	
Fecha del tercer análisis (tras aproximadamente 6 semanas)	
Fecha del cuarto análisis (tras aproximadamente 3 meses)	
Fecha del quinto análisis (tras aproximadamente 6 meses)	

Su médico puede decidir realizarle análisis de sangre adicionales cuando lo considere conveniente.

No olvide traer este folleto cuando visite a su médico.

Información dirigida a los pacientes en tratamiento con agomelatina en relación con el uso seguro y adecuado de los medicamentos que contienen este principio activo.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) octubre 2018

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

EFFECTOS ADVERSOS HEPÁTICOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE AGOMELATINA

INTRODUCCIÓN

Usted va a empezar a tomar un medicamento que contiene agomelatina. Debe saber que la agomelatina puede provocar efectos adversos en el hígado. Este folleto le proporcionará recomendaciones para evitar que dichos efectos aparezcan y le ofrecerá consejos para saber qué debe hacer en el caso de que a pesar de todo estos llegasen a producirse.

Recuerde que durante el tratamiento con agomelatina deberá seguir en todo momento las recomendaciones que establezca su médico en relación con la dosis que debe tomar del medicamento, el tiempo que deberá realizar el tratamiento, seguimientos que habrá que llevar a cabo (como por ejemplo programación de las citas o realización de análisis de sangre) etc.

Para una mayor información puede preguntar a su médico o farmacéutico y consultar el prospecto que se facilita en el envase del medicamento.

NO TODOS LOS PACIENTES PUEDEN TOMAR AGOMELATINA

Si usted padece (o ha padecido en el pasado) alguna enfermedad o alteración en el hígado, es muy importante que antes de empezar a tomar agomelatina informe a su médico al respecto ya que en su caso podría estar contraindicado tomar este medicamento.

Sepa que existen otras razones por las que la agomelatina podría no ser adecuada para usted, entre dichas razones se encuentran:

- ser obeso,
- ser diabético,
- consumir alcohol habitualmente,
- tomar otros medicamentos que puedan afectar el hígado.

¿QUÉ HACER PARA DETECTAR PROBLEMAS HEPÁTICOS DURANTE EL TRATAMIENTO CON AGOMELATINA?

1. Realizar análisis de sangre de forma regular

Antes de empezar a tomar agomelatina y también durante el tiempo que dure el tratamiento, su médico le realizará análisis de sangre de forma periódica para poder valorar el funcionamiento de su hígado.

- ¿Por qué hay que hacer estos análisis de sangre?

Hay que hacerlos porque durante el tratamiento existe la posibilidad de que aumenten los niveles de enzimas hepáticas. Este aumento puede indicar un funcionamiento incorrecto del hígado.

- ¿Cuándo hay que realizar estos análisis de sangre?

Estos análisis hay que realizarlos tal y como se indica en el siguiente esquema:

	Antes del inicio o al aumentar la dosis	Aprox. a las 3 semanas	Aprox. a las 6 semanas	Aprox. a los 3 meses	Aprox. a los 6 meses
Ánisis de sangre	✓	✓	✓	✓	✓

2. Estar atento ante la aparición de síntomas y signos indicativos de un posible mal funcionamiento hepático. Estos síntomas y signos son los siguientes:

- coloración amarilla de la piel o del blanco de los ojos,
- oscurecimiento de la orina,
- heces de color claro,
- dolor en la parte superior derecha del vientre,
- cansancio importante (especialmente asociado a alguno de los síntomas anteriores).

➤ **Sí estos síntomas aparecen, debe interrumpir inmediatamente el tratamiento y acudir urgentemente a su médico.**